

1과목 : 임상심리연구방법론

- 다음 중 분산분석에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 각 표본은 상호독립적이어야 한다.
  - ② 각 모집단의 분산은 등분산성을 가정하고 있다.
  - ③ 분산분석은 독립변수가 하나이상이고 종속변수가 하나인 경우에 시행되는 통계분석이다.
  - ④ 분산분석에서 F값의 산출은 집단간 편차자승합에 대한 집단내 편차자승 평균의 비로 나타난다.
- 회귀분석에서 종속변수를 효율적으로 설명하는 모형을 찾기 위하여 사용되는 방법이 아닌 것은?
  - ① 순차변수추가법(forward selection)
  - ② 역차변수추가법(backward selection)
  - ③ 순차변수제거법(backward elimination)
  - ④ 단계별변수선택법(stepwise selection)
- 다음 중 두 집단 간의 평균차이에 대한 통계적 검증력에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 표본크기
  - ② 제1종 오류의 확률
  - ③ 두 집단 평균 간의 실제 차이
  - ④ 표집방법
- 다음 중 표본의 크기를 결정하는 요인과 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 조사목적
  - ② 조사비용
  - ③ 분석기법
  - ④ 집단법 통계치의 필요성
- 다음 중 요인설계에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① t검증이나 일원변량분석보다 상대적으로 적은 수의 피험자를 이용해 동일한 질문에 답할 수 있다.
  - ② 주효과를 확인할 수 있다.
  - ③ 상호작용 효과를 확인할 수 있다.
  - ④ 종속변인이 두 개 이상인 설계이다.
- 척도제작시 요인분석(factor analysis)이 활용되는 경우로 틀린 것은?
  - ① 척도의 구성요인 확인
  - ② 문항들 간의 관련성 분석
  - ③ 척도의 신뢰도 계수 산출
  - ④ 척도의 단일 차원성에 대한 검증
- 어떤 연구에서 "미국의 도시 중 동양인의 비율이 높은 도시가 동양인의 비율이 낮은 도시보다 정신질환 발병률이 높다"는 결과를 얻었을 때, 이러한 연구결과로부터 "백인 정신질환자보다 동양인 정신질환자가 더 많다"고 결론을 내리는 오류를 무엇이라고 하는가?
  - ① 조건화 오류
  - ② 생태학적 오류
  - ③ 개인주의적 오류
  - ④ 일반화 오류
- 다음은 조사연구를 설계하고 진행할 때 거쳐야하는 일반적인 절차를 우선적으로 나열해 놓은 것이다. 다음 중 이러한 절차들을 올바른 순서로 재배열한 것은?

- |             |            |
|-------------|------------|
| A. 연구설계     | B. 연구문제 결정 |
| C. 가설 설정    | D. 표집방법 결정 |
| E. 연구결과 해석  | F. 자료의 코딩  |
| G. 자료의 통계분석 | H. 예비조사    |

- ① C→B→A→D→F→H→E→G
  - ② C→B→D→A→H→F→E→G
  - ③ B→C→A→D→H→F→G→E
  - ④ B→C→D→A→F→H→G→E
- 실험설계에서 조사대상자들이 동일한 조사를 반복해서 받게 되면, 두 번째 또는 세 번째 조사에서는 가능한 첫 번째 조사당시에 응답한 내용과 조금이라도 차이가 나는 응답을 하려는 경향이 짙게 되는 효과는?
    - ① 성숙효과
    - ② 실험효과
    - ③ 선별효과
    - ④ 조사도구효과
  - 대도시 학생의 ADHD 가능성을 알아보기 위한 연구가 시작되었다. 표집방법은 군집표집법(cluster sampling)을 사용하였다. 다음 중 무선표집 순서로 가장 적합한 것은?
    - ① 대도시→학군→학교→학급→학생
    - ② 학생→학급→학교→학군→대도시
    - ③ 대도시→학생→학급→학교→학군
    - ④ 학교→학급→학생→대도시→학군
  - 다음 ( )안에 들어갈 알맞은 것은?

상관계수의 의미는 두 변수들 간의 ( A ) 및 ( B )을 나타낼 뿐이지 상관계수가 두 변수들 간의 ( C )을/를 규명하는 것은 아니다. 즉, ( D ) 관계이지 어떤 변수가 다른 변수에게 영향을 미치는 것을 규명하는 기법은 아니다.

- ① A-관련성, B-방향성, C-인과관계, D-쌍방향
  - ② A-관련성, B-방향성, C-상관관계, D-단방향
  - ③ A-상관관계, B-종속성, C-인과관계, D-상방향
  - ④ A-상관관계, B-방향성, C-종속성, D-단방향
- 리커트 척도구성기법의 신뢰성을 검증하는 방법으로 틀린 것은?
    - ① 총점이 정규분포를 이루는가 살펴본다.
    - ② 각 항목의 점수와 총점의 상관계수를 산출한다.
    - ③ 크론바하 알파값을 산출하여 문항들의 내적일관성을 검증한다.
    - ④ 전체문항을 두 개의 조로 나눈 다음 각 조건의 상관계수를 산출한다.
  - 다음 중 산술평균의 특징에 관한 설명으로 틀린 것은?
    - ① 통계절차에 필요한 대수적 연산이 가능하다.
    - ② 표본이 클 때 극단의 점수에 의해 크게 영향을 받기 때문에 수집된 자료의 대표성을 상실할 우려가 있다.
    - ③ 추리 통계에서 산술평균은 다른 중심집중경향치에 비해서 표집 오차가 작아서 안정성(stability)이 있다.
    - ④ 측정수준이 등간이거나 비율척도가 되어야 산출된 평균치는 의미를 갖게 된다.

14. 외적 타당도를 저해하는 요소에 관한 설명이 아닌 것은?

- ① 측정도구나 관찰자에 따라 측정이 달라질 수 있다.
- ② 측정 자체가 실험대상자들의 행동을 변화시킬 수 있다.
- ③ 실험대상자 선정에서 오는 편향과 독립변수 간에 상호작용이 있을 수 있다.
- ④ 연구의 결과가 일반화될 수 있는가의 여부는 표집뿐만 아니라 생태학적 상황에 의해서도 결정될 수 있다.

15. 다음과 같은 특징을 지닌 연구방법은?

- 질적인 정보를 양적인 정보로 바꾼다.  
 - 예를 들어, 최근에 유행하는 드라마에서 주로 다루었던 주제가 무엇인지를 알아낸다.  
 - 메시지를 연구대상으로 할 수도 있다.

- ① 투사법                      ② 내용분석법
- ③ 질적연구법                ④ 사회성측정법

16. 지수와 척도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지수와 척도 모두 변수에 대한 서열측정이다.
- ② 척도점수는 지수점수보다 더 많은 정보를 전달한다.
- ③ 지수와 척도 모두 둘 이상의 자료문항에 기초한 변수의 합성 측정이다.
- ④ 지수는 동일한 변수의 속성들 가운데서 그 강도의 차이를 이용하여 구별되는 응답 유형을 밝혀낸다.

17. 다음 중 표집틀(sampling frame)이 모집단(population)보다 큰 경우는?

- ① A병원 환자를 환자기록부를 이용해서 표집하는 경우
- ② A병원 환자를 병원 입구에서 임의로 표집하는 경우
- ③ A병원 환자를 서울지역 휴대폰 가입자 명부를 이용해서 표집하는 경우
- ④ A병원 환자를 무선적 전화걸기(random digit digital)방법으로 표집하는 경우

18. 가설검정에 있어서 연구자가 범할 수 있는 제2종 오류(Type II error)는 어떤 경우에 발생하는가?

- ① 영가설이 참일 때 영가설을 수용하는 경우
- ② 영가설이 거짓일 때 영가설을 수용하는 경우
- ③ 영가설이 참일 때 영가설을 기각하는 경우
- ④ 영가설이 거짓일 때 영가설을 기각하는 경우

19. 다음 ( )안에 들어갈 알맞은 것은?

확률적 표본 추출방법 중 하나인 층화표본 추출에서 층 내의 연구대상들은 ( A )적 이며야 하지만 층 사이에서는 서로 ( B )적 이며야 한다.

- ① A - 동일, B - 이질                      ② A - 정, B - 동
- ③ A - 이질, B - 동일                      ④ A - 동, B - 정

20. 다음 중 통계적 추론에서 추정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 통계적 추정이란 표본에서 얻은 통계량을 이용하여 모집단의 모수를 추정하는 것이다.
- ② 기술통계학도 엄격히 말하면 추리통계적 요소를 가지고 있다고 할 수 있다.

③ 모수를 추정하기 위한 통계량을 추정치(estimate)라고 하고 표본조사의 결과로 얻은 추정치의 측정값을 추정량(estimator) 이라고 한다.

④ 기술통계학은 그 자신이 모수가 되는 거이고 추리통계학은 그 자신이 모수가 되기 어려운 표본에서 모수를 추정하는 것이다.

**2과목 : 고급이상심리학**

21. 다음 중 알코올 사용장애에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임신부의 과도한 음주는 태아알코올 증후군을 초래할 수 있다.
- ② 역조건 형성의 원리를 이용한 혐오치료가 알코올 사용장애의 치료에 활용된다.
- ③ 아시아와 라틴 문화권에서 남자의 알코올 사용장애의 비율이 여자보다 더 높다.
- ④ 지속적인 알코올 섭취는 말초신경계를 파괴시켜 코르사코프 증후군을 유발할 수 있다.

22. 정신분열증 약물 치료에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진정성 항정신병 약물은 환각이나 망상 등의 양성증상을 억제하며 추체외로 부작용이 가장 적다.
- ② 양성증상은 약물 치료에 의해 쉽게 호전되나 음성 증상은 쉽게 호전되지 않는다.
- ③ 정신분열 증상을 최대한 억제하는 동시에 긍정적 적응기능의 손상과 약물의 부작용을 최소화해야 한다.
- ④ 약물 치료로 증상이 호전되지 않을 경우 전기충격 치료를 시행해 볼 수 있다.

23. 다음 중 범불안장애의 원인에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정신분석 입장에서 볼 때 의식적 갈등이 주요 원인이나 방어기제에 의해 변형되므로 환자 자신은 불안의 이유를 자각하기 어렵다.
- ② 범불안장애는 여러 가지 사소한 자극에 대해 경미한 불안반응이 조건형성되어 나타나는 다중 공포증이다.
- ③ 현재 불안과 관련된 신경전달물질로 알려진 것은 GABA, Norepinephrine, Glutamate 등이다.
- ④ 범불안장애를 지닌 사람은 불확실성에 대한 내내력이 부족하며 파국적인 결과를 예상하는 인지적 특성을 지니고 있다.

24. 공황발작의 인지모델에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Clark는 위험지각이 걱정과 염려, 신체감각 고양, 파국적 해석으로 이어지고 이것이 다시 위험지각을 증폭시킨다는 공황발작 인지모형을 주장하였다.
- ② Beck은 불안장애 환자들이 과민한 경계체계를 가지고 있는 것으로 생각하고 신체 내부의 감각에 지나치게 집중한다고 생각하였다.
- ③ 불안민감성이 높지 않은 사람들은 공황이 시작되는 시점에 이를 깨닫지 못하므로 심한 발작에까지 이르는 경우가 더 많다.
- ④ 공황장애 환자들은 정보처리과정에서 공황발작과 관련된 위험자극에 대한 선택적 주의를 하기 때문에 이를 더 심각하게 자각하는 경향이 있다.

25. 다음 중 여성일 확률이 가장 높은 사람은?

- ① 소아기 붕괴성 장애를 진단받은 사람
- ② 레트장애를 진단받은 사람
- ③ 신경성 식욕부진증을 진단받은 사람

④ 경계선 성격장애를 진단받은 사람

26. 다음 중 물질 관련 장애에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물질의존을 진단 내리기 위해서는 내성과 금단 두 가지 증상이 필수적으로 존재해야 한다.
- ② 물질의존은 해당 장애가 12개월 이상, 물질 남용은 해당 장애가 6개월 이상 지속될 때 진단 내린다.
- ③ 니코틴의 경우 의존 진단은 가능하지만, 중독이나 남용은 진단 내리지 않는다.
- ④ 동일군의 물질에 대해 물질남용과 물질 의존을 함께 진단 내릴 수 있다.

27. 다음 중 성격장애의 명칭과 핵심 신념이 바르게 짝지어진 것은?

- ① 편집성 성격장애 - 타인은 착취하는 존재이다. 따라서 나도 양갈음으로 그들을 착취한다.
- ② 자기애적 성격장애 - 나는 타인에게 상처받기 쉽다.
- ③ 히스테리성 성격장애 - 가까운 관계는 이득이 없고 혼란스럽다.
- ④ 강박적 성격장애 - 나는 기본적으로 조직적이지 못하다.

28. 다음 사례와 가장 관계 깊은 장애는?

프로이트의 little Hans / 왓슨의 little Albert

- ① 공황장애                      ② 주요우울장애
- ③ 강박장애                      ④ 공포증

29. 다음 중 학습장애의 진단을 내릴 수 없는 사람을 모두 고른 것은?

- A. 지능이 50이고 성적이 그 지능 정도에 해당하는 A군
- B. 학습의 기회가 제공되지 않아서 배운 만큼만 성취한 B양
- C. 시력이 좋지 않아서 시각적 학습이 결여된 C군
- D. 비슷한 증상을 보이는 친구들과 비슷한 성적이나 반에서는 꼴찌인 자폐아 D양

- ① A, B                              ② B, C
- ③ A, C, D                        ④ A, B, C, D

30. 다음 중 회피성 인격장애에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 핵심문제는 수치심이다.
- ② 대인관계에 무관심하다.
- ③ 부모의 학대, 방임과 관련될 수 있다.
- ④ 분열성 인격장애와 연속선상에 위치한다.

31. 다음 중 주요 우울증 삽화로 진단하기 위한 가능성을 높이는 상황이 아닌 것은?

- ① 소아와 청소년의 과민한 기분
- ② 거의 매일 나타나는 불면이나 과다수면
- ③ 3개월 전에 경험한 사별 이후 지속되는 반복되는 죽음에 대한 생각
- ④ 병이 있는 것에 대한 자책이나 죄책감

32. 다음 사례에서 A씨에게 의심되는 질환으로 가장 적합한 것은?

A씨는 치매를 앓은 적이 없으나 며칠 전부터 의식이 혼탁해지는 증상이 생겼다. 주의를 집중하고, 유지하고 이동하는 것이 어려워졌고 주의력이 산만해지고 주의를 적절하게 이동하지 못하여 지나간 질문의 답에 계속 집착하는 모습을 보인다. 최근의 일들에 대한 기억력이 뚜렷하게 저하되었도 시간, 장소에 대한 지남력 장애가 나타나고 있다.

- ① 기억상실장애(amnestic disorder)    ② 혼수(coma)
- ③ Ganser 증후군                              ④ 섬망(delirium)

33. 신경성 식욕부진증에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 폭식과 하제의 사용이 동반될 경우 진단내릴 수 없다.
- ② 체중과 체형을 인식하는 방식이 왜곡되어 있다.
- ③ 체중과 체형이 자기평가에 과도하게 영향을 미친다.
- ④ 발병사례 중 사망률이 5~15%로 예측된다.

34. 다음 중 성적체감 장애에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 심리치료는 성적체감 장애에 대해 가장 효과적인 치료방법이다.
- ② 반대 성(性)에 대한 동일시가 성인기 초기에 들어와서 뚜렷하게 나타나는 경우는 어린 시절에 나타나는 경우 보다 반대 성에 대한 동일시가 불안정하며 안정화되는 경향도 약하다.
- ③ Freud는 성적체감 장애를 남근기에 고착된 현상으로 설명하고 있는데, 즉 이성의 부모를 과도하게 동일시하게 되면 이후에 성적체감 장애가 생긴다고 보았다.
- ④ 동성애와는 구분되는 장애이다.

35. 다음 중 이상행동의 준거에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 객관적 증상 이외에 본인의 주관적 불편감이 중요 기준이 될 수 있다.
- ② 사회적 기준은 문화와 시대가 변화하여도 동일하게 적용 가능하다.
- ③ 심리검사를 통해 이상을 평가하는 것은 통계적 기준과 깊은 관련이 있다.
- ④ 주관적 기준의 문제점 중 하나는 병식이 없는 사람에 대한 진단이다.

36. 다음은 무엇에 관한 설명인가?

사고의 흐름이 빨라져서 두 개의 연속적인 사고가 논리적인 연결로 이어지기는 하지만 사고의 목표가 오랫동안 지속적으로 유지되지 못하고 이야기의 주제가 쉽게 바뀌는 현상을 보이나 연상은 아직 정상적으로 이루어지는 현상

- ① 사고의 비약(flight of idea)
- ② 우연적 사고(circumstantial thinking)
- ③ 신어조작증(neologism)
- ④ 보속증(perseveration)

37. 다음 중 이상심리학의 역사에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 고대의 원시사회에서는 정신장애를 초자연적인 현상으로 이해하여 초자연적인 치료 방법을 사용하였다
  - ② 그리스 시대의 Hippocrates는 정신장애를 심리적 요인의 불균형에 의해 생긴 것으로 보고 조증, 우울증, 광증으로 분류하였다.
  - ③ 서양 중세 시대의 정신병자는 죄를 지어 하나님으로부터 벌을 받는 것이거나 마귀의 수족 역할을 하는 자로 규정되었다.
  - ④ 내과 의사였던 Pinel은 정신병자에게 인도주의적인 대우를 해 주어야 한다고 주장한 최초의 사람이다.
38. 다음 중 노인 우울증의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 젊은 연령층과는 달리 남녀 유병율이 비슷하다.
  - ② 신체증상, 건강염려증적 호소, 죄책감이 빈번하다.
  - ③ 기억을 효율적으로 인출하는 능력의 저하가 흔하다.
  - ④ 조발성(early onset)보다 만발성(late onset)에서 우울증 가족력이 높다.
39. 다음 성장애 중 절정감 장애에 해당하는 것은?
- ① 성욕감퇴장애                      ② 남성발기장애
  - ③ 질경련증                            ④ 조루증
40. 인간행동의 습득과정을 설명하고, 그것을 바탕으로 하여 변용을 시도하였으며 모델링 형성과정과 1차적 추동, 2차적 추동을 중요시한 이론적 모델은?
- ① 정신분석적 모델                  ② 생리학적 모델
  - ③ 행동주의 모델                      ④ 실존주의적 모델

**3과목 : 고급심리검사**

41. Korean Kaufman Assessment Battery for Children에서 검사자의 부주의로 어떤 하위검사를 실시하지 않았거나 검사 중에 예기치 못한 일이 발생하여 채점이 불가능하게 되었다. 또한 부득이한 이유로 특정 하위검사를 실시할 수 없는 상황이 벌어져 동상적인 방법으로 종합척도의 표준점수를 계산할 수 없을 때가 있다. 이때는 비례추정법을 사용하여 문제가 생긴 하위검사를 추정할 수 있는 데, 비례추정법의 사용이 불가능한 종합척도는?
- ① 순차처리척도                      ② 동시처리척도
  - ③ 비언어성 처리척도                ④ 습득도 척도
42. MMPI-2의 3개의 척도로 구성된 상승척도에 따라 일반적으로 진단되는 장애가 바르게 짝지어진 것은?
- ① 1-3-8 : 신체형 장애
  - ② 1-3-9 : 편집형 정신분열증
  - ③ 2-4-7 : 수동공격성 성격장애
  - ④ 6-8-7 : 강박적 성격장애
43. 다음 중 시공간 지각 및 구성능력을 측정하는 신경심리검사가 아닌 것은?
- ① Block Design Test
  - ② Stroop Test
  - ③ BGT
  - ④ Rey-Osterrieth Complex Figure Test
44. 다음 중 인지행동적 면담에서 강조하는 내용으로 가장 적합

- 한 것은?
- ① 현재의 정신병력 파악
  - ② 집단적 체계에 따른 진단과 합리적 치료계획 수립
  - ③ 문제행동의 선행요소와 반응결과에 영향을 주는 요인분석
  - ④ 내담자의 아동기 영향력 있는 사람들과의 정서적 상호작용

45. 다음 중 뇌졸중(stroke)으로 심한 언어장애를 보이고 있는 60대 환자의 지적 능력을 평가할 수 있는 가장 적합한 검사는?
- ① Trail Making Test
  - ② Wechsler Memory Scale
  - ③ Raven Progressive Matrices
  - ④ Rey Complex Figure Test
46. 비구조적 면담에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 내담자의 상태나 상황에 따라 면담의 절차나 형식이 달라질 수 있다.
  - ② 비구조적 면담을 통해 유용한 정보를 얻기 위해서는 임상가로서 상당한 정도의 숙련성이 요구된다.
  - ③ 많은 정보를 수집하기 어려울 뿐만 아니라 수집된 자료를 객관적으로 수량화하기가 어렵다.
  - ④ 면담과정에서 내담자의 자발성이 억제되기 때문에 연구 목적으로 흔히 사용된다.

47. A군(만 7세)은 수업 도중 집중하지 못하고 떠들거나 일어나 돌아다니고 주변 친구들이 싫어하는데도 툭툭치고 장난을 거는 등의 행동으로, 담임교사에게 여러 번 지적을 받았으나 변화가 없었다. A군의 문제를 평가하기 위해 가장 적합한 검사 배터리 구성은?

<p>A. 연속 수행 검사 (Continuous Performance Test, CPT)</p> <p>B. 웨슬러 유마용 지능검사 (K-WPPSI)</p> <p>C. 코너스 평가척도 (Conners Rating Scale)</p> <p>D. 아동기 자폐증 평점 척도(Childhood Autism Rating Scale, CARS)</p> <p>E. MFFT(Matching Familiar Figure Test)</p>
---

- ① A, B, D                              ② B, C, E
  - ③ A, C, D, E                          ④ A, B, C, E
48. 다음 중 임상심리 검사의 해석과 관련된 윤리적 지침에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 임상가는 특정한 해석을 뒷받침할만한 증거가 없는 경우 임상적 경험을 바탕으로 해석한다.
  - ② 임상가는 환자에게 검사 결과에 대한 해석뿐만 아니라 환자에게 도움이 된다고 판단될 경우 해석 오류의 가능성에 대한 정보도 알려주어야 한다.
  - ③ 컴퓨터를 이용한 검사에서는 자극조건이 동일하기 때문에 특별히 검사 환경을 고려할 필요가 없다.
  - ④ 장애를 가진 수검자와 일반 수검자의 기능을 비교하는 것이 검사의 주목적일 때 일반규준보다 특수규준을 사용한다.
49. 어떤 지능검사와 측정의 표준오차가 7점일 때, 지능검사 점수가 90점이라면 95% 신뢰구간에서 실제 지능 지수의 범위는 약 얼마로 추정할 수 있는가?



오경보 오류는 정상범위에 해당하였다. 이때 생각할 수 있는 심리장애가 아닌 것은?

- ① 정신지체      ② 주의력결핍 과잉행동장애-부주의 우세형
- ③ 우울 장애      ④ 품행 장애

60. 다음 중 아동의 각성수준과 충동성, 주의 유지력 등 주의력과 충동성을 직접적으로 측정할 수 있는 수행검사가 아닌 것은?

- ① 한국판 코너스 평정척도      ② 연속수행검사(CPT)
- ③ 주의력장애 진단시스템(ADS)      ④ TOVA

**4과목 : 고급임상심리학**

61. 임상심리학자의 윤리적 원칙과 이를 해결하기 위한 주요 접근법으로 가장 적절한 것은?

- ① 내담자의 궁극적인 치료 효과를 위하여 필요한 경우 치료자의 신분이나 치료적 접근을 위장하는 것이 필요하다.
- ② 치료 관계에서의 비밀 유지 원칙은 가장 필수적이고 기본적인 요소로서 법에 의해 정해진 경우가 아니라면 어떠한 내담자나 환자라도 이 원칙을 엄수해야만 한다.
- ③ 치료자도 전문인인 동시에 한 개인이다. 따라서 자신의 역전이에 항상 관심을 기울이고 이를 통하여 부정적인 치료 효과를 초래하는 일이 없도록 하여야 한다.
- ④ 치료자가 동시에 지도 교수나 사업동료 등의 다른 역할을 알고 있는 경우 전문적 관계뿐 아니라 개인적 관계도 적절하게 유지하여 각각의 역할 간의 균형을 유지하는 것이 필요하다.

62. 다음 중 성격개념에 대한 이론적 가정이 다른 것은?

- ① 캘리포니아 인성검사(California Personality Inventory)
- ② 16 성격 요인검사(16 Personality Factors Test)
- ③ 5요인 성격검사
- ④ 마이어 브릭스 유형지표 (MBTI: Meyer Briggs Type Indicator)

63. 심리치료의 초기발전에 기여한 인물과 활동이 바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① Freud - 정신분석은 의학의 전문분야가 아님을 주장했다.
- ② Dollard와 Miller - 정신분석 개념과 행동주의 이론의 통합 모색했다.
- ③ Carl Rogers - 심리치료 과정과 결과에 대한 체계적이고 경험적인 연구를 개발했다.
- ④ Arnold Lazarus - 치료의 대부분은 엄밀히 행동주의적인 것으로 설명될 수 있음을 주장했다.

64. 다음 중 신경심리학에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 신경심리학이란 두뇌 기능과 행동 간 관련성에 대한 연구이다.
- ② 두뇌 손상을 일으키는 원인으로는 외상, 독성물질, 퇴행성 질환과 성격장애가 있다.
- ③ 현대 임상신경심리학자는 검사 배터리를 융통성 있게 채택하여 평가한다.
- ④ 신경심리학자들은 진단, 회복의 예후, 개입과 재활에서 주요 역할을 감당한다.

65. 다음 중 심리치료를 종결해야 할 상황과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 치료과정에서 역전이가 나타날 경우
- ② 환자가 다른 지역으로 이사하여 지속적인 치료를 받기가 어려운 경우
- ③ 치료자가 충분한 지식이나 경험, 기술이 부족하여 더 이상 치료적 관계를 지속할 수 없다고 판단한 경우
- ④ 치료자와 내담자가 최선의 노력을 했지만 더 이상 진전이 없는 고원상태가 지속될 경우

66. 1차 세계대전과 2차 세계대전 사이의 임상심리학의 발전양상에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① Rorschach, TAT, DAP 등 주요 투사법 검사가 개발되었다.
- ② 미국의 경우 대다수의 임상심리학자들이 공식적인 수련 프로그램을 통해 석사 및 박사 학위를 소지하였다.
- ③ 미국의 경우 행동수정기법 이외에 분석적 심리치료도 임상심리학자들이 실시하였다.
- ④ 집단지능검사로서 비영어권용 아미-알파(army- $\alpha$ )와 영어권용 아미-베타(army- $\beta$ )가 개발되었다.

67. 다음 중 자각이 되지 않으나 타인과의 의사소통은 가능한 수준의 행위에 가장 적합한 평가 방법은?

- ① 질문지법      ② 관찰법
- ③ 자기감찰법      ④ 과제수행법

68. 다음 중 강박장애환자를 치료하는데 가장 적합한 것으로 경험적으로 타당화된 치료기법은?

- ① 행동조형기법과 홍수요법
- ② 노출과 반응방지치료
- ③ 자기주장훈련과 체계적 둔감법
- ④ 사회기술훈련과 재활치료

69. 정신질환에 대한 생물학적 접근이 갖는 가장 중요한 장점은?

- ① 이상행동의 원인을 밝혀 근원적인 치료를 할 수 있다.
- ② 연구와 치료에서 과학적으로 엄밀한 접근법을 사용함으로써 체계적인 지식을 축적할 수 있다.
- ③ 신체질환을 진단하듯이 정신적 문제를 진단함으로써 진단의 오류를 줄일 수 있다.
- ④ 정신질환이 생물학적 원인에 의해 발생했다고 설명함으로써 환자의 치료동기를 높일 수 있다.

70. MMPI-2의 타당도 척도에서 내용상 서로 반대되는 23개 문항쌍으로 구성되어 있고, 이 점수가 높을 때는 무분별하게 그럴다 반응을 하는 경향을 시사하는 척도는?

- ① F      ② TRIN
- ③ VRIN      ④ Fb

71. 행동평가에서 임상적 판단과 해석을 향상시키는 가장 적절한 방법은?

- ① 행동평가 시 많은 양의 정보들을 얻게 되므로 적절히 분류하고 단순화시켜야 한다.
- ② 행동평가는 결국 표본 행동의 획득 및 제한적 정보 수집을 기초로 하기 때문에 핵심 정보들을 중심으로 집중적 의미부여가 필요하다.
- ③ 행동평가의 타당성을 확보하기 위하여 충분한 기록을 하여야 하며 기회가 된다면, 충분한 추후조사를 실시하여 기록에 대한 검증과 확인을 거치는 것이 필요하다.
- ④ 행동평가에서 모든 상황과 환경적 요인을 알 수 없으므로

로 적절한 추정을 통하여 이를 보완하는 것이 필요하다.

- 72. 심리평가에 대한 치료적 모델의 특성이 아닌 것은?
  - ① 개별화된 목표를 위해 협력적 작업을 강조한다.
  - ② 환자와 평가자와의 사이에 일어나는 과정 중심적이다.
  - ③ 전문지식과 대인관계 기술을 갖춘 전문가에 의해 시행된다.
  - ④ 논리적 실증주의 이론에 기초한다.
- 73. 전문성, 시간, 에너지 또는 심리학적인 민감성이 결핍된 피자문자들이 스스로 그 과제를 행하도록 정보를 찾고, 그 결과의 전달을 강조하는 자문자의 역할은?
  - ① 전문가                      ② 수련가/교육가
  - ③ 진상조사자                ④ 과정전문가
- 74. 다음 중 노출치료에 대한 설명을 틀린 것은?
  - ① 노출은 가능한 짧아야 한다.
  - ② 노출은 불안을 유발해야 한다.
  - ③ 노출은 될 수 있는 한 공포스러운 자극에 주의를 기울이고 그 자극과 관계를 맺도록 노력해야 한다.
  - ④ 노출은 공포, 불안이 제거될 때까지 반복되어야 한다.
- 75. 가까운 미래의 행동 판단 및 임상가가 이미 확보한 개인사 자료와 동일한 상황의 판단 등이 긴밀하게 관계를 갖는 법심리학자의 주요활동 영역은?
  - ① 전문가 증인                ② 위험성 예측
  - ③ 법정참여 능력            ④ 양육권 결정
- 76. 지능평가에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 편차 IQ란 개인의 수행 점수를 개인의 연령집단과 비교하여 사출한 지능지수로 비율 IQ상 나이가 증가하는 것에 따라 지능이 낮아지는 것을 보완할 수 있다.
  - ② 인종에 따라서 지능의 집단차가 보이기 는 하나 이는 상당한 논쟁의 원인이 되는 결과로 인종 간의 우열로 보기 보다는 환경적인 문제로 볼 수도 있다.
  - ③ IQ점수와 학업적 성취와의 상관은 0.30 이하로 학업적 성취는 지능 이외의 동기, 교사 기대, 문화적 배경, 부모의 태도 등이 더 영향을 미친다.
  - ④ 쌍둥이 연구 등을 통하여 본 지능의 유전적 영향과 환경적 영향의 문제를 고려할 때 유전적 영향도 상당한 것으로 인정되며 그 설명변량은 약 50% 정도에 이른다는 결과도 있다.
- 77. 성인에 대한 진단/평가와 비교할 때 아동을 진단/평가 할 때의 주의사항에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?
  - ① 아동의 경우에는 성인에 비하여 지적인 측면이나 성격적 측면에서 탄력성을 가지고 있기 때문에 향후 발달 가능성이나 범위를 효과적으로 추정하는 것이 중요하다.
  - ② 아동은 스스로를 표현하는 능력이 부족하기 때문에 성인에 비하여 엄격하고 체계화된 구조적 면접 방식을 사용하는 것이 필요하다.
  - ③ 아동의 경우에는 정말 환자가 누구인지를 결정하는 것이 힘들며 부모와 같이 아동을 통제하는 대상자들이 진단 및 치료에 참가하는 것이 바람직하다.
  - ④ 아동의 경우 구체적이고 세부적인 행동을 통제하고 관리하는 행동적 접근이나 인지행동적 접근들이 유용한 수단으로 적용된다.
- 78. 변증법적 행동치료의 4가지 기술훈련 방식에 해당하지 않는

것은?

- ① 고통인내(distress tolerance)
- ② 행동시연(behavioral rehearsal)
- ③ 마음챙김(mindfulness)
- ④ 감정조절(emotional regulation)

79. 다음 중 위기면접에서의 면접자 태도로 적합한 것을 모두 고르면?

A. 환자와 원만한 라포형성이 중요하기 때문에 비지시적인 태도로 최대한 편안하고 마냥한 분위기를 조성한다.

B. 자신 및 타인을 해칠 중대한 위험이 있는지를 판단하기 위해 노력한다.

C. 정확한 임상진단보다는 환자의 안전에 대해 개입하는 것이 바람직하다.

D. 면접자는 결정적인 질문을 하는 동안 침착하고 명석한 태도를 유지하여야 한다.

- ① B, D                              ② A, B, C
- ③ B, C, D                        ④ A, B, C, D

80. 자기비난적인 내담자를 돕기 위한 합리적 정서행동치료(REBT)의 가정이 아닌 것은?

- ① 사람은 이성적이고 도덕적인 존재이다.
- ② 사람은 쉽게 패배적으로 생각하고 느끼고 행동할 수 있다.
- ③ 자기비난을 줄이기 위해서 타고난 창의성을 개발하기 위한 많은 부단한 노력이 필요하다.
- ④ 사람은 자신을 건설적으로 변화시킬 수 있다.

**5과목 : 고급심리치료**

81. 다음 중 현실치료의 기본 입장이 아닌 것은?

- ① 내담자에게 필요한 사람들과 관계를 맺는 법을 가르쳐 주는 것을 강조한다.
- ② 치료자는 자기 자신이 됨으로써 내담자들에게 관계를 맺는 법을 가르칠 수 있다.
- ③ 전이는 치료자나 내담자가 현재에 대한 책임을 드러내는 중요한 현상으로 간주한다.
- ④ 내담자에게 의미있는 관계로 향상되지 않는 한 증상 호전은 없기에 증상에는 관심이 적다.

82. 다음 중 성문제 치료의 지침으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 치료자는 가능하면 성에 관한 자신의 철학을 치료자로서의 역할과 일치시켜야 한다.
- ② 치료자는 성에 관한 상담과정에서 자신의 한계를 인식하고 그 한계를 넘어 상담하지 않도록 해야 한다.
- ③ 치료자는 내담자의 위장적 태도에 대처할 수 있어야 한다.
- ④ 치료자는 내담자가 성에 관해 거의 모르는 것으로 가정하는 것이 안전하다.

83. 다음 사례에서 가장 적절한 상담자의 개입은?

고등학교 2학년 A군은 평소 불량한 친구들과 어울려 술, 담배를 하고 공부에는 전혀 관심이 없다. 최근 길가에 세워둔 오토바이를 훔쳐 타다가 경찰에 붙잡힌 일로 부모님 손에 이끌려 치료를 받으러 왔다. A군은 부모와 치료자에 대해서 불만을 표현하고 "가출하겠다."고 위협하고 있다.

- ① A군과 부모님이 화해하도록 가족상담을 추진한다.
  - ② 부모의 잘못된 양육방식을 변화시키려고 노력한다.
  - ③ A군을 비난하지 않고 가출과 관련된 고민을 충분히 논의한다.
  - ④ 불량한 친구들과 어울리지 못하도록 전학을 권유한다.
84. 심리재활 이론에서 재활모형의 기본개념에 해당되지 않는 것은?
- ① 핸디캡(handicap)      ② 손상(impairment)
  - ③ 진단(diagnosis)      ④ 장애(disability)
85. 알코올중독 상담에서 폐해감소모델의 입장이 아닌 것은?
- ① 알코올 중독의 일차적 치료목표는 단주이다.
  - ② 내담자가 성취하고 싶은 변화량을 스스로 결정하도록 한다.
  - ③ 목적은 개인, 가족 및 지역사회에서 약물 사용과 관련된 문제를 감소시키는 것이다.
  - ④ 총체론적 관점에서 자신의 전체 삶과 음주의 역할을 검토하게 한다.
86. 만성 알코올 중독자인 A씨는 치료를 받지 않으면 이혼을 하겠다면서 자신을 입원시킨 부인과 자녀를 원망하고 치료의 필요성을 인정하지 않는다. A씨처럼 인식전단계(precontemplation stage)에 있는 내담자가 문제를 인식하고 변화를 준비할 수 있도록 치료자로서 가장 적절하게 개입한 것은?
- ① 내담자가 행동실천의 걸림돌을 인식하고 이에 대처할 수 있도록 계획을 세운다.
  - ② 내담자의 선택과 책임을 강조하면서 현실적이고 구체적인 목표를 설정하도록 돕는다.
  - ③ 이야기를 해도 될지 내담자의 허락을 구한 후, 입원하게 만든 사건을 탐색한다.
  - ④ 치료자는 내담자 스스로 변화 계획을 세우도록 돕고 실행 가능하지 확인해준다.
87. 성폭행이나 성추행의 피해자가 이후 자신의 애인과의 성관계 중에 외상을 재경험한다면 어떻게 하는 것이 권장되는가?
- ① 지속적 노출의 원리에 따라 갑작스러운 회상은 억누른다.
  - ② 상대방에게 즉시 알리고 갑작스러운 회상이 사라지도록 기다린다.
  - ③ 이완행동 및 안전함의 확인행동은 갑작스러운 회상과 연합될 수 있으므로 삼간다.
  - ④ 상대방에게 편안함을 구하는 행동은 자제한다.
88. 다음 중 불면증에 대한 행동치료적인 개입으로 틀린 것은?
- ① 잠을 자기위해서 자리에 누웠는데 약 10~15분이 지나도 잠이 오지 않으면 침실에서 나온 뒤, 다시 잠이 오면 침실로 들어간다.
  - ② 낮잠을 자지 않는다.

- ③ 잠자리에서 TV를 보거나 독서를 하는 것과 같은 활동은 하지 않는다.
  - ④ 항상 일정한 수면시간을 취한다.
89. 심리치료자의 행동과 태도에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 치료자의 과도한 자기개방은 대부분 내담자의 욕구에 따른 반응임을 알아야 한다.
  - ② 다양한 사람들의 독특한 배경은 공통적 배경보다 우선적인 관심사가 되도록 해야 한다.
  - ③ 자신의 습득한 이론과 기법에 따라 일관되게 내담자의 문제를 다루는 것이 더 효과적이다.
  - ④ 치료자로서 내담자의 성과 및 진전과 관련된 모호성을 잘 참을수록 치료관계는 공고해진다.
90. 치료초기 내담자 평가의 일부로 실시하는 정신상태평가에서 평가 영역과 질문의 예의 연결이 가장 바르게 짝지어진 것은
- ① 환각 - 당신의 생각이 외부의 어떤 힘에 의해 통제되는 것처럼 느끼니까?
  - ② 망상 - 당신의 정신이 마비된듯한 느낌을 갖습니까?
  - ③ 통찰 수준 - 당신이 어떻게 해서 입원하게 되었는지 알고 있습니까?
  - ④ 기억력 - 구르는 돌에 이끼가 끼지 않는다는 속담은 무슨 뜻입니까?
91. 품행장애 치료에 적용되는 부모훈련에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 서로 감정을 덜 다치게 하여 일반적으로 하루 2~3회 정도 발생하는 문제행동부터 시작한다.
  - ② 지시에 거부적인 부모들에게는 훈련과정에서 치료자와 부모의 역할을 바꾸면 효과적이다.
  - ③ 숙제를 해오지 못했다고 하는 부모에게는 전화를 해서 도와주어야 한다.
  - ④ 부모훈련의 요소들은 간단한 원리에 근거하기 때문에 효과적으로 쉽게 수행가능하다.
92. 사람들을 기피하고 방안에만 틀어박혀 있는 만성 정신 분열병 환자가 집 근처 헬스클럽에 다니는 것을 목표로 하여 사회기술훈련을 실시하고자 한다. 다음 중 훈련 프로그램에서 습득한 행동이 최대한 일반화될 수 있도록 하는 방안으로 가장 적합한 것은?
- ① 동일한 상황에서 한 가지 기술사용을 가르친다.
  - ② 보상을 점차로 지연시킨다.
  - ③ 목표 행동에 외적 보상이 반드시 수반되도록 한다.
  - ④ 목표 설정과 개입전략 선택에 보호자를 참여시킨다.
93. 내담자의 임상적 진단을 통해 상담 계획을 수립하는데 있어 임상가가 해야 할 업무과정에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
- ① 수집된 여러 단서는 수렴적으로 종합하고 검토해야 한다.
  - ② 발병 전의 기능 수준이 치료 목표가 될 수 있으므로 발병 전의 발달 수준과 가장 좋지 못했던 기능 수준을 평가하는 것이 바람직하다.
  - ③ 내담자의 취약성과 역기능 뿐 아니라 정신적 자산과 강점도 기술하여 제시할 필요가 있다.
  - ④ 가족의 심리장애에 대한 태도가 치료 예후에 영향을 미치므로 임상가가 이해한 바를 적절하게 공유해야 한다.

94. “공공장소에 가면 뭔가 끔찍한 일이 일어날 것이고 나는 그것에 대처하지 못할 것이다.”라는 신념을 갖고 있는 내담자에게 가장 효과적인 행동치료 기법은?  
 ① 실제 노출                      ② 자극 통제  
 ③ 이완 훈련                      ④ 모델링
95. 인지치료에서 불안, 우울과 같은 부정적 감정과 관련하여 인지적 요인의 중요성을 강조하는 이유가 아닌 것은?  
 ① 비합리적 신념은 정서 및 행동 문제에 영향을 주는 핵심적 요인이다.  
 ② 비합리적 신념은 대개 쉽게 의식할 수 있기 때문이다.  
 ③ 비합리적 신념의 변화는 감정과 행동에도 변화를 발생시킨다.  
 ④ 인지적 변화는 정서나 행동 변화보다 천천히 일어난다.
96. 다음 중 직업재활에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?  
 ① 직업재활은 재활의 궁극적 목적이다.  
 ② 직업 능력 평가에서 배치성은 직업의 다양한 요구 조건을 충족시킬 수 있는 개인의 특성을 말한다.  
 ③ 직업 재활을 위해서는 적절한 기능 평가를 하고 이를 토대로 훈련해야 한다.  
 ④ 직업 재활 시에는 단계적으로 정신과 환자의 독립심을 증가시켜가면서 실시하는 것이 좋다.
97. 다음 사례에서 A씨와 치료를 종결할 때의 요령으로 가장 적합하지 않은 것은?  
 ① 치료 종결과 재발 방지를 위한 준비는 치료 중기 이후에 시작한다.  
 ② 치료 과정 중 진척이 있을 때마다 공을 내담자에게 돌리고 칭찬해준다.  
 ③ 치료 종결 시점을 가능한 한 빨리 이야기해준다.  
 ④ 점차로 회기수를 줄이면서 치료자의 지지가 없이도 잘 해낼 수 있음을 깨닫도록 한다.
98. 다음 중 초기 면접의 진행에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 내담자 호소의 명확한 이해보다는 자유롭게 이야기하는 분위기 조성이 우선시 된다.  
 ② 내담자가 왜 하필이면 지금 이런 도움을 필요로 하는가를 분명하게 확인해야 한다.  
 ③ 제 3자 의뢰에 의해 내방한 경우 방문사유를 명확히 하는 직면이 바람직하다.  
 ④ 내담자의 기대를 확인하고 무엇이든 당연한 것으로 여겨서는 안된다.
99. Rogers가 제시한 인간중심치료의 기본 가정이 아닌 것은?  
 ① 자신의 이론을 정신분석이나 행동주의와는 대비되는 치료 과정에 대한 정론으로 제시하였다.  
 ② 내담자가 현실을 더욱 완벽하게 직면하는 방법들을 발견할 수 있는 능력을 가진다고 가정한다.  
 ③ 일관성, 수용성, 공감적인 치료관계는 지금-여기의 경험에 관심을 갖도록 이끈다고 가정한다.  
 ④ 모든 내담자에게 치료자는 실수할 수 있음을 전제한다.
100. 학습문제의 반복되는 자기 패배적 3단계 과정에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 비생산적 학습 단계 - 고정적이고 엄격하여 실행하기 어

- 려운 학습 계획을 세우는 단계  
 ② 유동적 전략 단계 - 불완전한 것에 유동성을 제공하는 단계  
 ③ 비합리적 학습 단계 - 계획을 실천하려고 실속 없이 애쓰는 단계  
 ④ 좌절감, 무력감 단계 - 결국 실패하여 자신의 능력에 대한 모멸감과 목표를 달성하지 못하여 좌절감을 느끼는 단계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	④	③	②	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	①	②	④	④	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	③	②	③	④	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	①	②	①	②	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	③	③	④	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	③	②	②	①	①	③	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	②	①	①	②	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	①	②	③	②	②	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	③	①	③	②	④	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	②	①	④	②	①	①	①	②