

1과목 : 임상심리연구방법론

- 다음 중 F분포의 가정에 해당되지 않는 것은?
 - ① 정규분포 가정 ② 변량의 동질성 가정
 - ③ 관찰의 독립성 가정 ④ 이분변인의 가정
- 통계적 추론(statistical inference)의 하나로 모집단의 실제 값이 얼마가 될 것이라는 주장에 대하여, 표본이 가지고 있는 정보를 이용하여 사전에 세운 주장이 합당한지 또는 합당하지 않은지에 대한 판정을 내리는 과정을 무엇이라고 하는가?
 - ① 추정(estimation)
 - ② 가설검증(testing hypothesis)
 - ③ 임계치(critical value)
 - ④ 불편추정량(unbiased estimator)
- 다음 중 상관분석의 적용을 위해 산점도에서 관찰해야 하는 자료의 특징이 아닌 것은?
 - ① 선형 또는 비선형 관계의 여부
 - ② 이상점의 존재 여부
 - ③ 자료의 층화 여부
 - ④ 원점(0, 0) 통과 여부
- 다음 중 연구가설로 가장 적합한 것은?
 - ① 시험에서 틀린 문제수가 적을수록 더 높은 점수가 나올 것이다.
 - ② 여성이 남성보다 성격이 더 좋을 것이다.
 - ③ 종업원들의 직무만족도가 높을수록 걸근하는 횟수가 적을 것이다.
 - ④ 사람은 해를 거듭할수록 나이가 많아질 것이다.
- 다음 설명 중 틀린 것은?
 - ① 실험집단은 처치를 가한다.
 - ② 통제집단은 실험집단과의 비교를 위해 만들어진 집단이다.
 - ③ 인간의 행동을 설명하기 위해 만들어낸 가설적 개념을 변인이라고 한다.
 - ④ 구인은 직접 관찰할 수 없다.
- 연구에 모집하는 대상자의 숫자는 윤리적인 문제, 비용 및 시간 측면에서 제한되어 있다. 그러나 표본 크기가 너무 작으면 실재하는 중요한 효과를 찾아내지 못할 가능성이 있다. 다음 중 표본의 크기를 결정하는 데 필요한 사항이 아닌 것은?
 - ① 검정력 ② 유의수준
 - ③ 관심 대상이 되는 최소 효과 ④ 모집단의 수
- 과학적 조사에서의 자료 수집 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 면접조사는 우편조사보다 응답율이 낮다.
 - ② 전화조사는 다른 조사에 비해 시간과 비용이 더 든다.
 - ③ 우편조사는 최소의 경비와 노력으로 광범위한 지역과 대상을 표본으로 삼을 수 있다.
 - ④ 집단조사는 응답자들에 대한 통제가 언제나 용이하다.
- 연구에서 포함된 X, Y 두 변수가 양적 비연속 변수이고 서열 척도로 측정된 경우 나타낼 수 있는 적합한 상관계수는?
 - ① 적률상관계수 ② 등위상관계수

- 양류상관계수 ④ 양분상관계수
- 다음 사례의 조사설계는 어떤 연구에 해당하는가?

정신건강 실태를 알아보기 위해 우리나라 국민들 중에서 10대 100명, 20대 100명, 30대 100명, 40대 100명, 50대 100명을 동시에 무선적으로 추출하며 정신건강을 조사하는 동일한 설문지를 사용하여 그들의 정신건강을 조사하였다.

 - ① 종단연구 ② 코호트연구
 - ③ 추세연구 ④ 횡단연구
- 조사대상이 되는 사람들의 태도, 감정, 동기, 욕망 등을 알아보기 위하여 모호한 자극을 제시한 후, 이에 대한 응답을 얻어 연구에 필요한 자료를 수집하는 방법은?
 - ① 사회성측정법 ② 투사법
 - ③ 유도법 ④ 실험법
- 연구자가 주관적으로 판단하여, 모집단을 가장 잘 대표한다고 생각되는 사례들을 표본으로 선정하는 표본추출 방법은?
 - ① 편의 추출 ② 층화추출
 - ③ 할당추출 ④ 목적추출
- 하나의 동전과 주사위를 던졌을 때, 동전은 뒷면이 나오고, 주사위는 2가 나올 확률은?
 - ① 1/5 ② 1/12
 - ③ 1/6 ④ 1/3
- 다음 중 온도처럼 측정값들의 차이에 의미를 부여할 수 있으나, "0"의 의미가 어떠한 의미를 가지고 있지 않고 자의적인 척도는?
 - ① 명목척도(nominal scale) ② 서열척도(ordinal scale)
 - ③ 등간척도(interval scale) ④ 비율척도(ratio scale)
- 구조방정식 모형에서 적합도 지수를 선택할 때에는 표본크기에 민감하지 않고 모형의 간명성을 고려하는 적합도 지수를 선택하는 것이 바람직하다. 이러한 기준에서 가장 권장할만한 적합도 지수는?
 - ① CFI 와 NNFI ② NFI 와 GFI
 - ③ CFI 와 CFI ④ NNFI 와 RMSEA
- 다음의 연구방법 중 변인들 간의 인과관계를 파악할 수 있는 것은?
 - ① 문헌연구 ② 상관연구
 - ③ 관찰연구 ④ 실험연구
- 다음 중 공변량 분석에서 타당한 자료 해석을 위해 가장 중요한 가정은?
 - ① 회귀선 기울기의 동일성 가정
 - ② 대칭행렬 가정
 - ③ 비직선성 가정
 - ④ 상호작용 효과 유효성 가정
- 5명의 학생에게 이들 중 자신이 좋아하는 학생 1명을 선택 하라고 하였을 때의 자유도와, 4개 집단의 수학적적능을 일원 변량분석으로 비교할 때 집단 간의 자유도를 더한 값은?
 - ① 5 ② 6

3 7 4 8

18. 다음 중 확률표본추출방법이 아닌 것은?

- ① 단순무작위표본추출법
- ② 층화표본추출법
- ③ 군집표본추출법
- ④ 할당표본추출법

19. 다음 사례에서 모수치를 추정할 때 발생할 수 있는 왜곡을 줄이기 위해 사용하는 집중 경향치로 가장 적합한 것은?

서울시민 1000명을 표본으로 추출해서 연봉의 수준을 계산하고자 하였다. 그런데, 표본 추출 과정에서 연봉이 500억원인 사람이 한 명 포함되었고, 나머지 999명은 2천만원에서 8천만원 사이의 연봉을 받고 있었다.

- ① 최빈치
- ② 중앙치
- ③ 평균치
- ④ 극단치

20. Osgood은 사물, 인간, 사건 등에 대한 개념이나 느낌을 양극의 뜻을 갖는 대비되는 형용사 군으로 만들어서 의미를 측정하는 의미분석법을 제안하였다. 의미분석에 사용되는 형용사 군은 3차원의 의미공간으로 구분 할 수 있는데 다음 중 3차원에 해당하지 않는 것은?

- ① 평가차원
- ② 인식차원
- ③ 능력차원
- ④ 활동차원

2과목 : 고급이상심리학

21. 행동주의 관점에서 구분하는 행동장애의 분류와 해당 장애가 틀리게 연결된 것은?

- ① 행동의 과잉 - 강박행동
- ② 행동의 결손 - 대인공포증
- ③ 부적절한 강화체계 - 물질사용장애
- ④ 자극과 반응체계의 붕괴 - 성 도착증

22. 다음 중 양극성장애의 치료에 대표적으로 사용되는 약물은?

- ① 프로작
- ② 리튬
- ③ 할리페리돌
- ④ 리탈린

23. 다음 중 나머지 셋과 다른 성격장애의 진단기준은?

- ① 직계가족 이외에는 가까운 친구나 마음을 털어놓는 친구가 없다.
- ② 신체적 착각을 포함한 유별난 지각경험을 한다.
- ③ 괴이하고, 엉뚱하거나 특이한 행동이나 외모를 보인다.
- ④ 과도한 사회적 불안이 친밀해져도 줄어들지 않고, 이는 자신에 대한부정적인 판단 때문이라기보다는 편집적인 두려움 때문이다.

24. 다음 중 치매에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 의식장애가 있다.
- ② 기억장애가 있다.
- ③ 획득된 지능의 감퇴가 일어난다.
- ④ 대부분 비가역적이고 진행성이다.

25. 다음 사례에서 A씨의 진단으로 가장 먼저 고려할 것은 무엇인가?

20세 남자 대학생인 A씨는 자신이 미칠지 모른다는 걱정이 있다. 지난 2년 동안 반복적으로 자신이 외부로 빠져나가는 듯한 느낌을 종종 경험했고, 자신의 몸이 죽은 것과 같은 감각을 동반하곤 했다. 더구나 이 기간 동안 몸의 균형을 잘 잡지 못해 넘어지거나 몸을 자연스럽게 통제하지 못하는 경우가 있었고, 의식이 흐려지는 것을 경험하기도 하였다.

- ① 해리성 둔주(dissociative fugue)
- ② 이인증 장애(depersonalization disorder)
- ③ 공황장애(panic disorder)
- ④ 신체변형장애(body dysmorphic disorder)

26. 다음 사례에서 사용된 치료기법은 무엇인가?

개에 대한 공포를 지닌 사람에게 근육이완훈련을 시행하고, 개와 관련해 공포를 느끼는 자극 상황을 심한정도에 따라 위계적으로 분류해 목록을 작성하게 하였다. 그 후 근육이완을 유도한 상태에서 목록 중 가장 약한 불안을 느끼는 자극 상황부터 차례로 제시하였다.

- ① 체계적 둔감법
- ② 혐오적 조건형성
- ③ 행동조성법
- ④ 토크이용법

27. 다음 사례에서 A씨에게 진단내릴 수 있는 장애는 무엇인가?

44세 남성인 A씨는 20세부터 술을 마셔왔다. 1년 전부터 한주에 4~5회 씩 마시게 되는 술 때문에 지각을 하거나 중요한 업무를 처리하지 못해 곤란을 경험하였고, 이 때문에 몇 차례나 술을 끊으려고 해보았지만 술을 마시지 않으면 손이 떨리고 불안감과 초조감이 강하게 들어 결국 다시 술을 마시게 되었으며, 마시는 술의 양은 점점 늘어났다.

- ① 알코올 의존
- ② 알코올 남용
- ③ 알코올 중독
- ④ 알코올 금단

28. 다음 중 Cloninger의 알코올 의존의 두 가지 유형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제1형 알코올 의존은 증상이 늦게 발달하는 편이다.
- ② 제1형 알코올 의존은 남자에게만 나타난다.
- ③ 제2형 알코올 의존은 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 관련된다.
- ④ 제2형 알코올 의존은 반사회적 문제를 비롯한 사회적 문제를 야기할 가능성이 낮은 편이다.

29. 특정 공포증에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① Mowrer 등의 2요인설에 따르면, 공포회피반응은 정적 강화에 의해 유지된다.
- ② DSM-IV의 특정공포증은 DSM-III-R에서는 단순공포증으로 불렀던 심리장애이다.
- ③ Mowrer 등의 2요인설에 따르면, 공포반응은 고전적 조건형성에 의해 습득된다.
- ④ 정신역동이론에서는 억압, 전치, 투사의 방어기제가 공포

증의 형성에 기여한다고 설명한다.

30. 다음 성장애 중 절정감 장애에 해당하는 것은?
 ① 조루증 ② 질경련증
 ③ 성욕감퇴장애 ④ 남성발기장애
31. 다음 중 범불안장애와 가장 관련이 깊은 증상은?
 ① 공포(fear)
 ② 부유불안(free-floating anxiety)
 ③ 상대불안(state anxiety)
 ④ 상황적 자율신경계 불안(situational automatic anxiety)
32. 아동기 주의력 결핍/과잉행동장애(ADHD)에 흔히 동반되는 장애가 아닌 것은?
 ① 의사소통장애 ② 운동조정장애
 ③ 학습장애 ④ 아스퍼거 장애
33. 다음 중 정신분열병 진단을 내리기 위해 다른 증상 확인이 추가로 필요한 경우는?
 ① A씨: 모든 음식에서 쓴 맛이 난다며 아내가 음식에 건강을 해치는 약을 탕다는 피해망상을 보임
 ② B씨: 보이지 않는 전파가 자신의 생각을 다 빼내어 세상에 전파시킨다는 피해망상을 보임
 ③ C씨: 자신이 하려는 행동을 금지하거나 다른 행동을 지시하는 환청이 지속적으로 들림
 ④ D씨: 두 사람의 남녀가 서로 싸우며 대화하는 환청이 지속적으로 들림
34. 다음 중 용어와 그에 대한 예가 틀리게 짝지어진 것은?
 ① 자극 일반화 : 하얀 쥐와 듣기 싫은 쇠소리를 함께 반복적으로 제시하자 하얀 쥐를 무서워하게 된 아이가 하얀 말도 무서워하게 되었다.
 ② 2차적 조건형성 : 종소리에 침을 흘리도록 학습된 개에게 종소리와 손뼉 치는 소리를 짝지어 반복적으로 제시하자 개는 손뼉 치는 소리에도 침을 흘리게 되었다.
 ③ 부적강화: 시끄러운 소음이 들리는 상자 안에서 고통스러워하던 고양이가 우연히 상자 속 버튼을 누르자 소음이 멈추었다.
 ④ 소거: 술을 마시는 사람에게 술을 마실 때마다 구토를 일으키는 약물을 복용하게 해 술을 회피하도록 하였다.
35. 다음 중 정신분열병 환자의 재입원 발생과 가장 관련이 높다고 알려진 현상은?
 ① 이중 구속(double bind)
 ② 표현된 정서(expressed emotion)
 ③ 자아경계(ego boundary)의 붕괴
 ④ 슈나이더의 1급 증상
36. 특정공포증과 사회공포증을 치료하는 데 일반적으로 가장 효과적이라고 알려져 있는 일반적인 방법이 순서대로 짝지어진 것은?
 ① 정신분석적 치료 - 약물치료
 ② 정신분석적 치료 - 행동치료
 ③ 약물치료 - 인지행동적 집단치료
 ④ 행동치료 - 인지행동적 집단치료
37. 다음 중 정신분열병의 양성, 음성증상에 대한 설명으로 옳

- 은 것은?
 ① 음성증상은 도파민 체계의 이상과 관련된다.
 ② 양성증상은 만성화되며 약물에 잘 반응하지 않는다.
 ③ 음성증상의 대표적인 것은 환청과 망상이다.
 ④ 잔류형 정신분열증의 주된 증상은 음성증상이다.
38. 다음 중 지능평가에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 집단으로 실시된 지능검사에 의거해서는 정신지체진단을 내릴 수 없다.
 ② 정신지체의 중등도 수준은 IQ 35~40수준에서 50~55수준까지의 범위이다.
 ③ 정신지체의 경도 수준은 초등 2학년 수준정도까지의 교육이 가능하다.
 ④ 19세 이후에 발병한다면 정신지체 진단을 내릴 수 없다.
39. 수면장애(Sleep Disorder)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 불면증에 걸리기 쉬운 사람들의 주요한 심리적 특성은 높은 각성 수준을 유지하는 것으로 대표적인 치료법으로는 자율훈련(autogenic training)이 있다.
 ② 과다 수면증은 빠르게 잠들고 지속적인 수면을 취하나 아침에 깨어나기 어렵고 졸음과 피곤에서 헤어날 수 없으며 잠에 취한 상태가 지속된다.
 ③ 일주기 리듬 수면장애는 수면-각성 주기의 변화로 인해 과도한 졸음이나 불면이 반복되는 경우이다.
 ④ 악몽장애 환자의 경우 무서운 꿈에서 깨어난 후, 신속하게 정상적인 의식을 회복하나 대부분 꿈의 내용을 상세하게 기억하지 못한다.
40. 다음 중 나머지 장애와 다르게 분류되는 인격장애는?
 ① 분열형 인격장애 ② 경계성 인격장애
 ③ 반사회적 인격장애 ④ 자기애성 인격장애

3과목 : 고급심리검사

41. 단축형 지능검사를 실시할 수 있는 상황과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 정신장애를 감별하고 성격의 일부분인 지능에 대한 대략적인 평가가 목적인 경우
 ② 과거 1년 이내에 full battery 검사를 받은 적이 있고, 임상적으로 특이한 변화가 없는 경우
 ③ 임상 평가의 목적이 피검사자의 전반적인 지능수준의 판단인 경우
 ④ 평가의 목적이 신경심리학적 특성을 파악하고자 하는 경우
42. K-WAIS의 소검사 중 공통성 문제 점수에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 주의 집중력 ② 사고의 유연성
 ③ 부정적 태도 ④ 개인적 흥미와 관심분야
43. MMPI 2-0 코드 유형을 보이는 사람에 대한 적합한 진단적 해석은?
 ① 사고의 분열과대인관계 회피성을 보인다.
 ② 경미하나 만성적이고 성격적인 우울증을 보인다.
 ③ 화나고 우울한 상태로, 타인에게 적대적이다.
 ④ 다양한 신체증상과 더불어, 감정의 기복을 보인다.

44. MMPI에서 타당도 척도의 프로파일(L 40, F 75, K 43)과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 병역을 기피하기 위한 꾀병 환자
- ② 최근 남자친구와 헤어진 후 죽고 싶다고 호소하는 여대생
- ③ 외견상 잘 나타나지 않으나 사고장애가 있는 정신증 환자
- ④ 자아 정체성의 위기를 겪고 있는 청소년

45. 다음 ()안에 들어갈 가장 알맞은 것은?

대다수의 피검사자가 검사를 너무 쉽다거나 너무 어렵다거나 혹은 부적절하거나 불필요하게 본다 면, ()가 검사태도에 영향을 미쳐서 피검사자의 협조적이고 솔직한 응답태도를 결정하는데 부정적인 역할을 하게 된다.

- ① 내용 타당도 ② 준거 타당도
- ③ 구성 타당도 ④ 안면 타당도

46. K-WAIS를 실시하는 절차에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 언어장애와 같은 특별한 결함이 있는 수검자에게는 실시요강의 절차를 엄격히 고집하기보다 동작성 검사를 먼저 실시하여 가벼운 기분으로 검사에 임하도록 유도할 수 있다.
- ② 언어성 검사에서 대답이 불완전하거나 불분명한 경우 자세히 대답을 해달라고 요구해서는 안된다.
- ③ 지능검사는 성능검사이기 때문에 최대한 솔직한 응답을 하도록 유도한다.
- ④ K-WAIS는 표준화된 검사이기 때문에 실시와 채점, 해석에 관한 특별한 훈련을 필요로 하지 않는다.

47. 심리학적 평가보고서 작성법에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 심리학적 평가보고서는 일차적으로 의뢰된 문제에 대한 평가 결과를 중심으로 기술 되어야 한다.
- ② 보고서를 작성할 때는 가능한 전문적 용어를 사용하여 전문성이 부각되도록 진술하여야 한다.
- ③ 심리평가의 결과는 충분한 검토를 거쳤다 하더라도 현실이 아닌 하나의 가설일 수 있다는 사실을 인정하여야 한다.
- ④ 심리학적 평가보고서를 작성할 때는 심리검사 결과뿐만 아니라 면담, 행동관찰을 통해 알게 된 정보도 함께 고려하여 작성한다.

48. MMPI 검사의 타당도 척도 중 (무응답척도)가 상승할 수 있는 이유와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 부주의
- ② 불충분한 읽기 수준
- ③ 채점이나 기록상 오류
- ④ 의미 있는 답변에 요구되는 정보나 경험이 없을 때

49. 유동 지능에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선천적으로 주어지는 능력이다.
- ② 중추신경계의 성숙에 비례하여 발달하고 쇠퇴한다.
- ③ 언어이해능력, 논리적 추리력, 상식 등에서 확인된다.

④ 새로운 상황을 만났을 때의 문제해결능력에서 나타난다.

50. 신경심리평가에서 치매와 우울증의 감별점으로 적절하지 않은 것은?

- ① 동기가 부족한 우울증 환자는 모른다는 대답을 많이 하는 반면 치매 환자들은 생각 없이 틀린 답을 하는 경향이 있다.
- ② 우울증 환자들은 자신이 손상된 인지 능력에 대해 좀 더 예민하게 자각하며 더 크게 받아들인다.
- ③ 구성과제에서 치매 환자에 비해 우울증 환자는 충분한 시간과 격려가 주어져도 완성하지 못하고 단편적인 반응을 보인다.
- ④ 기질적 치매는 우울증과는 달리 실어증, 실행증, 실인증이 나타난다.

51. 연속수행검사에서 충동성 혹은 억제능력의 부족을 나타내는 대표적인 지표는?

- ① 누락오류 ② 오경보오류
- ③ 정반응 ④ 반응시간

52. 직업 흥미검사에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 짝지은 것은?

A. 진로탐색을 위한 프로그램에 직업 흥미를 측정하는 것이 전형적으로 포함된다.
 B. 흥미검사 제작 시 예연타당도가 가장 중시되지만, 동시타당도로 대체하기도 한다.
 C. 흥미검사들은 일반직업 주제의 구성타당화 연구에 필수적으로 사용된다.

- ① A ② A, B
- ③ A, C ④ A, B, C

53. 아동용 심리검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인물을 그리는 그림검사는 어린 시절의 발달환경을 측정하기 위해 투사적 성격검사로 개발된 것이다.
- ② BGT의 도형을 오류없이 모사할 수 있는 나이는 10세경이다.
- ③ HTP 검사에서 나무그림은 보다 심층적 수준의 자기상을 반영한다.
- ④ Rorschach 검사에서 적절한 부분반응이 가능해지는 시기는 6~7세경이다.

54. 편차 IQ 규준을 사용하는 지능검사에서 지능지수가 130점이 나왔다면 해당되는 백분위 점수는?

- ① P62.26 ② P68.26
- ③ P84.13 ④ P97.72

55. 다음 중 Wechsler 지능검사의 신뢰도를 추정하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 검사-재검사법
- ② 반분신뢰도 중 기우 절감법
- ③ 반분신뢰도 중 전후 절감법
- ④ 내적일관성 방법

56. 다음 특성을 보이는 내담자의 다면적 인성검사 상승척도 쌍으로 추정될 수 있는 것은?

자신이 과거에 행한 행동에 강한 죄책감을 느끼면서 상담을 요청한 내담자가 있다. 이 내담자는 과거에도 충동적인 행동을 하고 난 뒤 상담을 요청한 적이 있었으며, 당시 어느 정도 상담의 효과가 있는 듯 하였다. 하지만 내담자는 극단적인 행동을 주기적으로 보였으며 죄책감이 들 때마다 여러 상담자를 찾았고, 그럴 때마다 단기간의 상담만을 받았다고 한다.

- ① 2-4 ② 4-7
- ③ 3-4 ④ 4-8

57. 좌측 전두엽 손상을 보이는 환자를 면담할 때 관찰될 수 있는 행동은?

- ① 언어를 이해하지 못한다.
- ② 말을 유창하게 하지 못한다.
- ③ 우측 시야에 놓인 물건을 자각하지 못한다.
- ④ 간단한 계산을 하지 못한다.

58. 다음 중 BGT 검사에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 뇌의 기질적 장애를 판별하려는 목적으로 사용된다.
- ② 문화나 언어적인 제약을 받지 않는 검사이다.
- ③ 정신지체를 진단하는데 도움이 된다.
- ④ 검사 초반보다는 라포 형성 이후에 사용하는 것이 좋다.

59. MMPI의 4-9/9-4 척도 상승 형태 분석에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반사회적 인격 장애 특징을 나타낸다.
- ② 도덕 수준이 낮으며 자기애적이고 쾌락을 추구한다.
- ③ 행동적 수준에서 타인과의 마찰이 많고 정열적이다.
- ④ 정신치료에 수용적이므로 통찰적 정신치료가 효과적이다.

60. 심리검사에 관한 윤리적 쟁점으로 적합하지 않은 것은?

- ① 부당한 검사 사용으로부터 수검자를 보호하기 위해 자격을 갖춘 검사자가 검사를 사용해야 한다.
- ② 검사의 목적이 무엇이든 사생활 보호에 대한 검사의 적합성 및 사전 동의를 포함해야 한다.
- ③ 심리적 혼란을 야기하더라도 검사를 정확하게 채점하고 해석하여 검사 결과를 있는 그대로 알려주어야 한다.
- ④ 문화가 서로 다른 집단에 실시할 경우 검사결과 해석 시 문화적 차이를 고려해야 한다.

4과목 : 고급임상심리학

61. 임상심리학의 연구방법론에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 통제된 관찰 : 우울증 환자의 의사소통 패턴에 관하여 연구하기 위해 우울증 환자와 정상인을 함께 집단으로 구성하여 1시간 동안 토론 하게 한 후 주요 의사소통 5가지 패턴을 보이는지에 대하여 평가한다.
- ② 역학조사 : 관내 초등학생들을 대상으로 주의력 장애의 가능성을 평가하고, 세부 영역 상 어떤 주의력 문제를 보이는지 주의력 장애의 패턴에 대하여 조사한다.
- ③ 상관법 : 사회적 지지관계의 양과 질이 우울증상과 어느 정도 관련이 있는지를 보기 위하여 사회적 지지관계 척도를 사용한 사회적 관계의 특성을 평가하고 우울증상

설문지를 실시하여 비교/분석한다.

- ④ 사례연구 : 인터넷 중독을 보이는 중학생들을 대상으로 하여 1시간 가량 인터넷을 사용하도록 하고 이들이 방문한 사이트, 각 사이트에 머물렀던 시간, 클릭 회수 등에 대하여 분석한다.

62. 다음 중 행동치료 기법이 아닌 것은?

- ① 체계적 둔감법 ② 역설적 의도
- ③ 노출치료 ④ 유관성 관리

63. 다음 중 합리적 정서행동치료(REBT)의 비합리적 신념에 해당하지 않는 것은?

- ① 절대적인 강요성(Absolutistic musts)
- ② 파국화(Awfulizing)
- ③ 낮은 인내력(I-can't-stand-it)
- ④ 역경(Adversity)

64. 다음 중 임상심리학자의 교육적 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 6학년 교사를 대상으로 학습의 남학생과 여학생들 사이의 갈등을 중재하는 방법에 대한 조언
- ② 간호사를 대상으로 심리치료에 관한 워크샵 수행
- ③ 회사 직원을 대상으로 스트레스 관리법에 관한 강의
- ④ 5명의 임상심리 수련생을 대상으로 심리평가에 관한 사례지도

65. 일반적인 자문의 단계를 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 상황의 평가 → 질문의 이해 → 중재전략과 반응개발 → 종결 → 추적조사
- ② 중재전략과 반응개발 → 상황의 평가 → 질문의 이해 → 추적 조사 → 종결
- ③ 상황의 평가 → 중재전략과 반응개발 → 질문의 이해 → 추적 조사 → 종결
- ④ 질문의 이해 → 상황의 평가 → 중재전략과 반응개발 → 종결 → 추적조사

66. 다음 중 정신장애의 재활 모델에서 장애 때문에 다른 사람들로 부터 상대적으로 불이익을 받는 것을 의미하는 개념은?

- ① 손상 ② 진단
- ③ 핸디캡 ④ 병리

67. 어떤 전문가가 다른 전문가의 비윤리적 행위를 의심하게 될 경우 가장 먼저 취하여야 할 행동은?

- ① 당사자에게 주의를 환기시키고 비공식적 해결을 위한 시도를 한다.
- ② 피해자의 진술 및 사실 관계 등의 증거를 확보한다.
- ③ 당사자에게 인지한 사실을 통보하고 해당 윤리위원회에 신고한다.
- ④ 사태 해결을 위해 법률적 적법절차를 개시한다.

68. 임상심리학의 과학자-전문가 모델에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진단, 치료, 연구 외에도 일반심리학, 행동의 정신역동, 인접 학문 분야의 교육과정이 강조된다.
- ② 1949년 Boulder 모델로 알려져 있으며, 박사학위 과정 취득을 요구한다.
- ③ 임상심리학자는 일차적으로 심리학자이고 이후 임상가가

되어야 함을 강조하는 모델이다.

- ① 1970년대 Vail 모델로 계승되어 과학과 임상 실습을 모두 포용하는 특징을 보인다.

69. 건강과 다양한 심리적 요인과의 관계에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 사회적 지지 등과 같은 사회심리적인 요인들도 스트레스에 중요한 변인으로 작용한다.
- ② Type A 성격이나 적개심과 같은 성격적인 요인들이 심장관련 질병과 연관되어 있다.
- ③ 흡연이나 과도한 음주 등의 잘못된 행동, 습관, 생활양식들은 인지적인 요인이나 행동적 학습에 의해 형성된 것이다.
- ④ 비만 등과 같은 유전적 및 신체적인 요인의 문제에 대해서는 약물치료와 외과적 수술치료가 효과적이며, 심리적 개입은 제한적이다.

70. A씨는 최근 다음과 같은 행동특징을 보이고 있다. A씨가 주로 사용한 방어기제는 무엇인가?

A씨는 매인과 헤어진 후 양극성장애가 발병하였다. 평소 자신이 초라하다고 느꼈으나 이제는 무엇든 할 수 있다는 생각이들어 갑자기 회사에 사표를 내고, 박사학위를 취득하기 위해 대학원에 진학할 계획을 세웠다. 매인이 죽었기 때문에 더 이상 슬퍼할 이유가 없다고 생각하고 있으며, 오히려 마음이 홀가분하고 행복한 상태라고 말하였다.

- ① 부인, 반동형성 ② 치환, 투사
- ③ 투사, 억압, 행동화 ④ 투사, 부인, 주지화

71. 다음 중 면접에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 면접은 환자의 과거사를 알려주고 환자가 대인관계상황에 참여하고 관찰될 수 있는 기회를 제공해 준다.
- ② 의식으로부터 해리된 정보나 환자에 의해 언어화되기 어려운 정보를 얻기 위해서 면접이 필요하다.
- ③ 면접의 신뢰도를 높이기 위해서 구조화된 면접이 제안되기도 하며, 인성질문지는 구조화된 면접의 한 형태로 볼 수 있다.
- ④ Adler 학파의 심리학자는 개인의 출생순위와 가족 내 위치에 관해서 더 알고 싶어한다.

72. 정신분석적 치료의 기본 입장이 아닌 것은?

- ① 무의식의 의식화를 통해 본능과 충동을 강화된 자아의 통제 하에 둔다.
- ② 표면적인 행동의 변화는 내적 갈등의 해결없이 무의미하다.
- ③ 치료자는 내담자가 저항할 때도 중립적 자세를 견지한다.
- ④ 치료자는 내담자의 3가지 성격구조 중에서 자아를 우선시하는 관계를 맺는다.

73. 신경심리검사를 실시할 때 검사 점수에 영향을 미치는 변인이 아닌 것은?

- ① 성별과 나이 ② 궤병여부와 병전 능력
- ③ 손잡이와 체중 ④ 교육수준과 동기

74. 국내 임상심리학자들의 주된 활동역과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 환자의 심리적인 문제나 증상들에 대하여 심리치료의 실행
- ② 임상적 주요 이슈들에 대한 연구를 수행
- ③ 환자의 증상이나 증상의 원인에 대한 심리검사를 통한 진단과 평가
- ④ 가벼운 증상의 경우 처방에 의한 투약을 통해 증상을 개선

75. 행동적 접근 및 인지행동적 접근에서 주로 사용하는 치료기법과 증상이 가장 적합하지 않게 짝지어진 것은?

- ① 스트레스를 많이 경험하는 환자를 대상으로 하여 긴장된 스트레스 상황에서 긴장을 해결하기 위한 "이완기법"을 사용함
- ② 광장공포증이 있는 사람들에게 많은 사람들 앞에서 연설을 하도록 하는 "노출치료"를 사용함
- ③ 극심한 소극성을 가진 환자들을 대상으로 하여 다른 사람에게 자신이 요구하는 바를 말하도록 하는 "자기주장 훈련"을 실시함.
- ④ 인터넷 중독에 빠진 중학생을 대상으로 하여 컴퓨터 사용 시 처벌을 가하는 "형오치료"를 실시함

76. 행동치료 시행에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신체적 고통으로 오는 아동의 행동도 조작적 절차를 통해서 완화시킬 수 있다.
- ② 아동의 경우 주 치료자 이외의 주변인물에 의한 조작적 절차는 치료효과가 거의 없다.
- ③ 형오치료는 형오자극이 보다 긍정적인 자극으로 변환되게 하는 조건형성 절차이다.
- ④ 형오치료는 문제행동이 생명이나 건강에 위협적일 경우로 한정되어 적용되는 것이 좋다.

77. Rorschach 검사에서 1번 카드의 응답내용과 관계 깊은 항목은?

- ① 새롭고 친숙하지 않은 상황에서의 반응
- ② 성적인 갈등
- ③ 대인관계
- ④ 권위적인 인물과의 관계

78. 다음 중 행동평가에서 참여관찰의 주요 이점을 설명한 것은?

- ① 행동평가에 필요한 비용이 적게 들고 자료를 쉽게 얻을 수 있다.
- ② 내담자에게 문제행동에 대한 이해를 증가시킬 수 있어 치료과정이 가속화 된다.
- ③ 자신의 사적인 행동까지 평가가 가능하기 때문에 평가의 정확도를 높일 수 있다.
- ④ 광범위한 자연장면에서 행동을 관찰할 수 있기 때문에 생태학적 타당도를 높일 수 있다.

79. 성격의 범주적 진단분류에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 질적인 차이를 강조한다.
- ② 전문가 간의 의사소통이 쉽다.
- ③ 전문가 간의 합의를 이끌어내기 쉽다.
- ④ 전문가 간의 객관적 결정의 가능성이 높다.

80. 다음 중 지능검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유동분석적 요인은 새로운 문제를 해결하는데 요구되는 형태 및 비언어적 자극들과 관련된 인지적 기술들을 측

정한다.

- ② 결정화된 능력 요인은 문제해결을 위한 언어적 개념과 수량적 개념을 획득하고 적용하기 위해 필요한 인지적 기술을 측정한다.
- ③ 지능은 교육에 의해 그리고 주류 문화에 노출됨으로써 향상될 수 있다.
- ④ WAIS-R의 세 요인은 언어적 이해력, 지각적 조직화 능력, 운동협응력 등을 포함한다.

5과목 : 고급심리치료

81. 정신사회재활의 기본 목표와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 각 개인의 능력을 사회적응이 가능하도록 호전시킴
- ② 주거환경 및 사회적 환경의 변화를 최대화 함
- ③ 병전 기능을 회복하여 양질의 삶을 유지하도록 함
- ④ 증상이 더 이상 악화되지 않고 유지되도록 함

82. 다음 중 정신분열증 환자관리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 환자가 정신과적 증상이 심할 때는 평소보다 더 예민해지고 피해의식을 가지는데, 이때는 환자와 평소 사이가 나쁜 가족은 환자를 만나지 않도록 하는 것이 좋다.
- ② 환자의 이상행동이 가족에게 많은 피해를 주더라도 환자의 증상이기 때문에 가족들이 그런 행동을 못하도록 관리하면 안 된다.
- ③ 환자가 환청을 보일 때 침착하게 환자의 입장을 이해하는 태도로 자세하게 구체적으로 물어본다.
- ④ 만약 환자의 망상 때문에 가족이 위험하다고 생각되면 주치의에게 빨리 연락하고 입원시키는 것이 좋다.

83. 인지행동치료에서 틀린 가정이거나 잘못된 개념을 이끄는 체계적 오류와 인지적 왜곡 중 다음은 무엇에 관한 설명인가?

사상의 부분적인 세부 사항을 근거로 결론을 내리는 것

- ① 선택적 추론 ② 과잉 일반화
- ③ 근거 없는 추론 ④ 극단적 사고

84. 다음 사례에서 A양에게 읽기 이해력을 증진시키기 위한 가장 적합한 개입은?

A양은 학교에서 수업을 따라가지 못하고 초등학교 4학년인데도 읽기 속도가 느리고 이해력도 부족하다. 어머니가 직접 가르치고 학원에도 보내봤지만 별로 소용이 없었다고 한다.

- ① 단어 하나하나에 집중하기보다는 덩어리나 군 단위로 읽도록 한다.
- ② 읽기의 목적이 무엇인지 파악하도록 한다.
- ③ 조용히 배경음악을 틀고 혼자서 읽도록 한다.
- ④ 기본 시선은 무선의 주안에 두도록 한다.

85. 중독환자에 대한 인지행동치료의 통합적 사회-인지적 저항 모델에서 “나쁜 일은 나쁜 사람에게 발생한다.”는 식의 신념으로써 환자의 저항이 있는 경우를 무엇이라고 하는가?

- ① 정당성 인정 저항 ② 자기일관성 저항
- ③ 도덕성 저항 ④ 심리도식(스키마) 저항

86. 누군가 우리를 멍청하다고 생각하더라도 그것이 그리 비극적인 것이 아님을 느끼게 하는 RET의 절차로 불친절한 웨이터에게 팁을 거부하거나 공구점에서 왼손잡이용 공구를 비치하라고 요구하는 등의 다소 과장된 행동을 하게 하는 절차는?

- ① 역할연기 ② 수치심-공격연습
- ③ 유머사용 훈련 ④ 신념 논박하기

87. 자신 및 타인을 해칠 위험성에 대한 평가에서 자살의 위험 요소에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자살에 대해 구체적으로 질문하는 것은 어려운 문제를 다루는데 면담자가 미숙하다는 것을 반영한다.
- ② 배우자가 없는 것은 자살의 위험요인이고 돌보아야 할 자녀가 있다는 것은 자살을 방지하는 보호요인이다.
- ③ 자살에 대한 이야기는 하기 어려운 주제이나 면담 시마다 반드시 물어보아야 한다.
- ④ 자살 시도는 여성이 더 많이 하고, 자살 성공률은 남성에서 높다.

88. 비행 청소년의 심리치료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비행 청소년은 심리적 욕구가 다양하기 때문에 문제 해결에 다각적 접근이 필요하다.
- ② 면담을 통한 전통적인 치료만으로는 한정된 효과 밖에 얻지 못한다.
- ③ 청소년 비행 문제에 대해 보호조정과 정신 건강의 측면을 함께 다루어야 한다.
- ④ 처벌이나 훈육 같은 행동주의적 방법은 내담자의 이해가 따르더라도 사용해서는 안 된다.

89. 다음 중 노인상담의 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내담자의 저항이 약하다.
- ② 내담자의 경험의 폭이 넓다.
- ③ 상담자보다 내담자의 연령이 높다.
- ④ 새로운 삶에 대한 의지가 약하다.

90. 인간중심 치료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일치성은 치료자가 진실하고 통합되어 있고 솔직하다는 뜻이다.
- ② 내담자를 한 인간으로서 진정하고 깊이 있게 관심을 가지되 이것은 무조건적이어야 한다.
- ③ 치료자는 치료회기 동안 모든 상호작용에서 드러나는 경험과 감정을 민감하고 정확하게 이해하는 공감이 필요하다.
- ④ 일치성, 무조건적 긍정적 관심 공감적 이해는 연속적이거나보다는 실무율적으로 존재한다.

91. 심리치료 상담에서 방어를 다루는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 자아 강도를 고려하여 방어를 그대로 두는 것이 유익하다면 무시하는 것도 방법이 된다.
- ② 조증 환자처럼 기분 상태가 비정상적인 환자는 주의를 다른 곳으로 전환시키는 것도 효과적이다.
- ③ 해석은 자신의 문제를 표현하는데 어려움을 겪는 환자에게 자신의 행동을 직면하도록 하기 위해 일반적으로 직면에 앞서 상용되는 방법이다.
- ④ 자신이 방어기제를 구사하고 있음을 직면하기 위해서는 자신의 문제에 대해 어느 정도 통찰이 있어야 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	③	③	④	③	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	④	④	①	③	④	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	②	①	①	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	①	④	②	③	④	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	④	①	②	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	④	③	②	②	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	①	④	③	①	④	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	④	④	④	①	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	①	②	③	②	①	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	④	④	③	④	④	②	①	④