

1과목 : 임상심리연구방법론

1. 새로 개발된 불안장애 진단 도구의 공인타당도를 평가하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 불안 장애 전문가들에게 새로 개발한 도구에 대한 설명서를 제공하고 그들의 의견을 묻는다.
- ② 한 집단을 대상으로 새로운 도구로 진단하고 그 결과를 널리 사용하는 다른 진단도구의 결과와 비교한다.
- ③ 새로운 도구를 사용하여 1년 동안 진단한 사람의 수와 기존에 널리 사용하던 도구를 사용하여 1년 동안 진단 한 사람의 수를 비교한다.
- ④ 한 집단에게 몇 년 동안 새로운 도구를 사용하여 반복적으로 측정된 개개인의 진단이 얼마나 일관성 있는지 측정한다.

2. 다음에서 설명하고 있는 독립변수 선택 방법은?

회귀분석의 분석방법 중 여러 개의 독립변수 중에서 설명력이 어느 정도 높은 변수들로부터 회귀모형을 구성하기 위한 방법으로 첫 단계에서 종속변수와 상관관계가 가장 높은 변수가 회귀식에 들어가고 두 번째 변수부터는 부분상관이 높은 변수의 순서로 들어가는 방법이다. 각 변수가 입력될 때마다 이미 선택된 변수에 대한 유의성 검증이 추가적으로 이루어지며, 유의미하지 않으면 제거된다. 진입조건을 충족시키는 변수가 더 이상 없는 경우 분석이 종료된다.

- ① 입력(enter) ② 단계선택(stepwise)
- ③ 전진(forward) ④ 후진(backward)

3. 상호작용을 분석하기 위한 전략으로 가장 적합한 것은?

- ① 제거전략(dismantling strategy)
- ② 추가전략(constructive strategy)
- ③ 처치간 성과비교전략(comparative outcome study strategy)
- ④ 래그-연계분석전략(lag-sequential analysis strategy)

4. 가설에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가설이란 연구문제에 대한 잠정적인 해답으로 볼 수 있다.
- ② 가설은 독립변수와 종속변수와의 관계로 서술된다.
- ③ 가설은 항상 기존이론으로부터 도출한다.
- ④ 경험적 검증을 위한 작업가설은 명료하여야 하고, 가치중립적이어야 한다.

5. 독립변수가 두 개 이상으로서 모든 독립변수가 처치변수일 때 두 처치변수 간의 상호작용을 분석할 수 있는 설계 방법은?

- ① 무선화구획설계 ② 배속설계
- ③ 완전무선화요인설계 ④ 무선화구획요인설계

6. A와 B에 들어갈 용어를 바르게 짝지은 것은?

확률적 표본 추출방법 중 하나인 층화표본추출에서 층 내의 연구대상들은 (A) 이어야 하지만, 층 사이에서는 서로 (B) 이어야 한다.

- ① A - 동질적, B - 이질적 ② A - 정적, B - 동적
- ③ A - 이질적, B - 동질적 ④ A - 동적, B - 정적

7. 표본으로부터 모집단의 특성을 추측하기 위한 통계적 방법은?

- ① 기술통계 ② 실험통계
- ③ 추론통계 ④ 표본전집법

8. 다음에서 설명하는 분석은?

기존의 이론이나 선행연구의 결과를 바탕으로 측정변수와 잠재변수 간의 관계를 사전에 미리 규정한 후, 실제 자료를 통해 사전에 가정한 요인구조가 적합한지 검증하는 분석방법이다.

- ① 확인적 요인분석 ② 탐색적 요인분석
- ③ 혼합 요인분석 ④ 다층 요인분석

9. $p(A \text{ or } B) = p(A) + p(B)$ 라면 A와 B는?

- ① 연속적이다. ② 상호배타적이다.
- ③ 종속적이다. ④ 중첩된다.

10. 과학적 연구의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 경험적 검증 가능성을 중시한다.
- ② 보편적 법칙의 발견을 목표로 한다.
- ③ 선행 이론을 토대로 가설을 설정한다.
- ④ 관찰된 현상에 대해 형이상학적인 설명 방법을 이용한다.

11. 3개 이상의 실험집단이 있을 때 여러 번 t검증을 하면 어떤 오류의 가능성이 커지는가?

- ① 영가설의 오류 ② 영가설을 받아들일 위험
- ③ Type I 오류 ④ Type II 오류

12. 추정에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 구간추정은 영가설하에서 모수치의 범위를 알려준다.
- ② 점추정은 영가설하에서 모집단 평균의 범위를 알려준다.
- ③ 점추정과 구간추정 모두 가설검정에 쓰인다.
- ④ Z-통계량에 의해 가설을 검증하는 방법은 점추정에 의한 방법이다.

13. 상관분석을 하기 위해 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 표본의 크기가 작으면 표본에 따라 상관계수가 변하게 되어 모집단의 상관계수와 멀어질 수 있다.
- ② X변수의 각 점수에 대응하는 Y점수의 분산과 Y변수의 각 점수에 대응하는 X점수의 분산은 상이해야 한다.
- ③ 상관관계가 있다고 인과관계가 있는 것은 아니다.
- ④ 극단값은 상관계수에 영향을 미친다.

14. 다중회귀분석 시 발생할 수 있는 문제가 아닌 것은?

- ① 더미변수(dummy variable)

- ② 다중공선성(multicollinearity)
- ③ 자기상관(autocorrelation)
- ④ 이분산성(heteroscedasticity)

15. 표준편차에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 변량의 양의 제곱근 값이다.
- ② 모든 변인값이 동일하면 표준편차는 0 이다.
- ③ 표준편차가 크다는 것은 점수들이 평균으로부터 상대적으로 멀리 떨어져 있다는 것을 의미한다.
- ④ 모집단으로부터 추출한 표본의 평균들이 모집단 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 알려준다.

16. 심한 부적편포를 이루고 있을 때 적합한 집중경향치와 변동 지수를 순서대로 바르게 짝지은 것은?

- ① 산술평균, 표준편차 ② 중앙치, 표준편차
- ③ 산술평균, 사분편차 ④ 중앙치, 사분편차

17. 피험자 내 설계(within-subject design)의 장점으로 가장 적합한 것은?

- ① 이중 은폐절차의 사용이 가능하다.
- ② 연습효과가 있어 정확한 데이터 수집이 가능하다.
- ③ 개인차로 인한 실험의 효과를 통제할 수 있다.
- ④ 이월효과(carry-over effect)를 통제할 수 있다.

18. 측정의 일관성은 있으나 측정하고자 하는 것을 측정하지 않을 때 가장 우려되는 오차는?

- ① 측정오차 ② 표준오차
- ③ 추정오차 ④ 체계적 오차

19. 다음 분산분석 결과 표에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ에 들어갈 숫자는?

source	SS	SS	MS	F
집단간	24	(ㄱ)	(ㄴ)	(ㄷ)
집단내	24	6	4	
전체	48	8		

- ① ㄱ : 3, ㄴ : 8, ㄷ : 2 ② ㄱ : 2, ㄴ : 12, ㄷ : 3
- ③ ㄱ : 2, ㄴ : 8, ㄷ : 2 ④ ㄱ : 3, ㄴ : 8, ㄷ : 3

20. 다음 사례의 외적타당도 저해요인으로 가장 적합한 것은?

새롭게 개발된 심리치료가 효과가 있는지 보기 위해서 심한 우울증 내담자를 대상으로 연구를 진행하였다. 그런데 새롭게 개발된 심리치료는 심한 우울증을 가진 내담자에게는 효과가 있었지만 약한 우울증을 가진 내담자에게는 효과가 없었다.

- ① 종다처치에 의한 간섭효과
- ② 사전검사와 실험처치 간의 상호작용
- ③ 피험자 선발과 성숙 간의 상호작용
- ④ 피험자 선발과 실험처치 간의 상호작용

2과목 : 고급이상심리학

21. 경계선 성격장애의 치료에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정신역동치료에서는 내담자의 아동기 경험을 강조하고, 전이가 충분히 발달되도록 허용한다.
- ② 행동치료에서는 내담자의 행동 레퍼토리의 결함에 주목하여, 보다 좋은 사회기술을 가르치려 한다.
- ③ 인지치료에서는 내담자가 현실경증을 보다 잘 할 수 있도록 잘못된 인지를 찾아내어 변화시키려 한다.
- ④ 변증법적 행동치료에서는 분노와 충동성을 조기에 직접적으로 다루며, 내담자의 책임을 분명히 한다.

22. 일주일 리듬 수면-각성 장애에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불규칙한 수면-각성형의 24시간 내 수면 시간의 총합은 동일 연령대의 정상 시간에 해당된다.
- ② 아침에 늦게 일어나고 밤늦게까지 깨어 있는 올빼미식의 수면-각성 주기를 지닌 사람은 지연된 수면단계형에 해당한다.
- ③ 조기 수면단계형은 남성에게서 많이 나타난다.
- ④ 비24시간 수면-각성형은 맹인에게서 흔히 나타난다.

23. DSM-5에서 분류한 수면이상증(parasomnias)에 해당하는 것은?

- ① 수면발작증 ② 호흡 관련 수면장애
- ③ 악몽장애 ④ 불면장애

24. DSM-5에서 우울장애에 관한 특성을 모두 고른 것은?

ㄱ. 개인의 능력과 의욕을 저하시켜 현실적 적응을 어렵게 만드는 주요한 요인이다.
 ㄴ. 주요 우울장애 진단을 내리려면 지속적인 우울한 기분, 흥미나 즐거움의 현저한 저하 중 하나는 반드시 포함되어야 한다.
 ㄷ. 주요 우울장애가 1년 이상 지속되면 지속성 우울장애로 진단명이 바뀌게 된다.
 ㄹ. 일반적으로 남성보다 여성에게 더 흔하다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

25. 성격장애 환자들 중 자기파괴성으로 인해 환자들을 도우려 하는 사람들을 가장 불쾌하게 만드는 사람은?

- ① 반사회성 성격장애자 ② 경계성 성격장애자
- ③ 연기성 성격장애자 ④ 자기애적 성격장애자

26. 일정 기간 동안 특정한 정신장애를 새롭게 지니게 된 사람의 비율을 나타내는 용어는?

- ① 발병률 ② 기간유병률
- ③ 시점유병률 ④ 기간발병률

27. 신경성 폭식증에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반복적인 폭식행동을 한다.
- ② 체중증가를 억제하기 위해서 반복적이고 부적절한 보상행동을 한다.
- ③ 체중과 체형이 자기평가에 과도한 영향을 미친다.
- ④ 정상체중을 유지하지 못한다.

28. 일반적으로 여성에게서 더 많이 발견되는 것으로 알려진 성격장애를 모두 고른 것은?

ㄱ. 자기애성 성격장애	ㄴ. 연극성 성격장애
ㄷ. 의존성 성격장애	ㄹ. 분열성 성격장애
ㅁ. 경계성 성격장애	

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ

29. 인지행동치료에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개인이 처한 문제상황의 해결에 초점을 두고 최선의 문제해결방법을 치료자와 함께 계획하고 실행한다.
 ② 다양한 스트레스 상황에 대처하는 여러 인지 행동적 기술을 습득한다.
 ③ 자신이 가지고 있는 부적응적 인지를 적응적 인지로 대체한다.
 ④ 무의식적 갈등이 자신의 삶을 어떻게 지배하고 있는지를 검토하고 더 이상 그 갈등에 의해 지배되지 않도록 실제 생활 속에서 적응적 행동을 실천한다.

30. 신경성 식욕부진증에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 체중 증가에 대한 공포를 지닌다.
 ② 실제로 매우 말랐음에도 불구하고 뚱뚱하다고 인식한다.
 ③ 90% 이상이 여성에게 발생하며 청소년기의 여성에게 흔하다.
 ④ 우울증, B군 성격장애를 동반하는 경향이 있다.

31. DSM-4에서 편집증 증상이 덜 심각한 것부터 심각한 것으로 순서가 바르게 나열되어 있는 것은?

- ① 편집성 성격→편집증→편집성 성격장애→편집형 정신분열증
 ② 편집성 성격→편집성 성격장애→편집증→편집형 정신분열증
 ③ 편집성 성격→편집성 성격장애→편집성 정신분열증→편집증
 ④ 편집증→편집성 성격→편집성 성격장애→편집형 정신분열증

32. 다음에서 설명하고 있는 것은?

단일한 유전자에 의해 전달되는 유전적 장애로 뇌조직세포가 진행성 퇴화를 보이는 것이 특징이며, GABA라는 신경전달물질이 부족하여 발생하는 질환이다.

- ① 픽 질환 ② 헌팅턴 질환
 ③ 파킨슨 질환 ④ 알츠하이머 질환

33. DSM-5에서 다음 설명에 가장 적합한 진단은?

20세 남자 대학생인 A씨는 자신이 미칠지 모른다는 걱정이 있다. 지난 2년 동안 반복적으로 자신이 외부로 빠져나가는 듯한 느낌을 종종 경험했고, 자신의 몸이 죽은 것과 같은 감각을 동반하곤 했다. 더구나 이 기간 동안 몸의 균형을 잘 잡지 못해 넘어지거나 몸을 자연스럽게 통제하지 못하는 경우가 있었고, 의식이 흐려지는 것을 경험하기도 하였다.

- ① 해리성 둔주(dissociative fugue)
 ② 이인증/비현실감 장애(depersionalization disorder)
 ③ 공황장애(panic disorder)
 ④ 해리성 정체감 장애(dissociative identity disorder)

34. 정신장애의 발병에 유전적인 요인과 환경적인 요인이 함께 작용한다고 주장한 이론은?

- ① 쌍둥이 이론 ② 취약성-스트레스 이론
 ③ 매개적 인과이론 ④ 중다요인 이론

35. 정신분열증의 양성 증상(positive symptom)으로 틀린 것은?

- ① 와해된 행동 ② 환각
 ③ 정서적 둔마 ④ 망상

36. 다음에서 K씨에게 가장 적합한 진단은?

K씨는 자신이 특출하게 우수한 존재라고 생각하며 사회적으로 성공해야한다는 야심에 불타있다. 출세를 하며 많은 사람의 경탄을 받는 상상에 혼자 즐거워 하곤 한다. 사람이나 우정은 사치스러운 것이라고 생각해온 K씨는 결혼도 자신의 사회적 출세에 도움이 되도록 재력이 딸라 했다. 동료 사이에서 건방지고 거만한 사람이라는 평을 받고 있고, K씨는 이러한 평에 몹시 화가 나긴했지만 무능한 자들의 질투심에 나온 것이라고 생각하곤 한다.

- ① 연극성 장애 ② 자기애성 장애
 ③ 과대망상 장애 ④ 편집성 장애

37. 아스퍼거 장애에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 언어발달의 지연
 ② 발달수준에 맞는 친구관계 발달의 실패
 ③ 사회적 또는 감정적 상호관계의 결여
 ④ 대상의 부분에 지속적인 집착

38. 정신상태검사(mental status examination)에서 평가하는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 의식의 수준 ② 주의지속의 폭
 ③ 장기기억 ④ 기분

39. 정신분석이론에서 다음에 해당하는 성격 발달단계는?

현실적 성취와 원만한 대인관계를 위한 적응 능력이 발달하는 단계로 좌절 경험 시 열등감이 형성되고 소극적이고 회피적인 성격 특성이 나타날 수 있다.

- ① 항문기 ② 구강기
 ③ 성기기 ④ 잠복기

40. 사회불안장애의 원인과 치료에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인지적 입장의 연구자는 사회공포증을 지닌 사람들은 자신이 타인에게 호감을 주지 못한다는 뿌리 깊은 믿음을 지니고 있다고 본다.

- ② 흔히 사용되는 약물로는 베타억제제를 비롯하여 삼환계 항우울제와 MAO 억제제가 있다.
- ③ 주의가 자신에게 향해지는 자기초점적 주의로 불안해하는 자신을 관찰하며 더욱 불안해진다.
- ④ 사회공포증은 인지행동적 접근에 바탕을 둔 개인치료가 가장효과적이다.

3과목 : 고급심리검사

41. 청소년 내담자의 우울 정도를 측정하기 위한 도구와 가장 거리가 먼 것은?

- ① MMPI-A ② PAI-A
- ③ 16PF ④ BDI

42. 적성검사에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 정서적 성숙도를 측정한다.
- ② 직업에 대한 흥미를 측정한다.
- ③ 새로운 상황에서의 적응능력을 측정한다.
- ④ 특정 직업군에서의 성공가능성을 예언한다.

43. 심리평가 보고서 작성에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 보고서 작성 시 검사 자료에 대한 임상가의 해석을 잘 조화시키고 결론에 대해 합리적인 근거를 제시해야 한다.
- ② 보고서는 내용을 잘못 이용할 소지가 있기 때문에 기본적으로 전문 용어를 중심으로 작성해야 한다.
- ③ 보고서는 의뢰자가 알고 있는 바와 전혀 모르는 바를 연결시키는 중간 구성개념을 도입하는 것이 유용하다.
- ④ 보고서는 문장의 길이를 짧게 하고, 단락을 구분하되 한 문단 내에서는 하나의 개념에 초점을 맞추는 것이 좋다.

44. MMPI 타당도 척도 중 F척도에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수검 태도의 지표로 비일상적 반응 경향을 효과적으로 탐지할 수 있다.
- ② 통계적으로 임상척도 프로파일의 척도치를 교정하는데 사용한다.
- ③ 일반적인 적응 수준을 추론할 수 있다.
- ④ 정신병리 정도를 지적하는 좋은 지침이 될 수 있다.

45. MMPI를 실시하고 채점하는 과정에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 투사적 성격검사에 비해 실시와 채점이 용이하다.
- ㄴ. 자기보고형 검사이기는 하지만, 수검자에게 최대한 협조를 이끌어 낼 수 있는 라포형성이 중요하다.
- ㄷ. 응답하지 않은 문항수 자체가 중요한 해석적 의미가 있으므로, '가급적 빠뜨리지 말고 다 응답해 달라'는 등의 응답을 강요하는 사전 지시를 삼가해야 한다.
- ㄹ. 문맹자의 경우 검사자가 문항을 읽어주면서 실시 할 수 있다.
- ㅁ. 수검자의 상태에 따라서는 몇 번에 걸쳐 나누어 실시할 수도 있다.

- ① ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

46. 검사의 신뢰도 및 타당도에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반분신뢰도는 문항의 분리 방법에 따라 속도검사에는 적합하지 않을 수 있다.
- ② 검사-재검사 신뢰도는 시간 경과에 따른 검사 결과의 안정성을 측정한다.
- ③ 내용타당도는 능력검사보다 성격검사나 적성검사에서 더 중요하게 다루어진다.
- ④ 동형검사 신뢰도가 낮은 것은 두 검사가 동일한 특성이거나 기술을 측정하고 있지 못함을 의미한다.

47. 종합신경심리평가 결과가 다음과 같을 때, 손상이 가장 뚜렷할 것으로 예측되는 뇌의 영역은?

- 주의를 전환하고 통제하는 능력에 손상이 시사됨
- 기억자료의 저장과 인출을 위해서 자발적으로 맥락을 사용하는 능력의 손상이 시사됨
- 사회적 상황에 대한 민감성이 둔화됨
- 보속증(perseveration) 혹은 상동증(stereotypy)의 행동양상이 관찰됨

- ① 측두엽 ② 두정엽
- ③ 전두엽 ④ 후두엽

48. 주의집중력을 측정하는 신경심리검사에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 연속수행과제(CPT)는 지속적 주의력을 측정한다.
- ㄴ. ADS는 연속수행과제로 ADHD 진단에 사용된다.
- ㄷ. Trail Making Test B형은 주의전환(attention shift)을 측정한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

49. MMPI-2에서 다음과 같은 문제행동을 잘 변별해 낼 수 있는 임상척도는?

- 다른 사람의 동기를 의심한다.
- 분노감을 느끼고 적대적이다.
- 투사적 방어기제를 주로 사용한다.
- 자신이 충분한 대우를 받지 못하고 있다고 생각한다.

- ① Pd ② Pa
- ③ Sc ④ Ma

50. 비구조화된 면담에 비해 구조화된 면담의 특징으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 면담자 변인이 개입되기가 어렵다.
- ② 다량의 자료를 모으기가 용이하다.
- ③ 실시 절차상 융통성을 발휘하기가 어렵다.
- ④ 선택적인 정보수집이 용이하다.

51. 다음에서 설명하고 있는 것은?

Cattell의 지능의 2요인 중 선천적으로 타고나는 것으로 10대 후반이나 20대 초반에 정점에 도달하며, 뇌손상이나 정상적 노령화에 따라 감소되는 지적 능력이다.

- ① 결정적 지능 ② 전체적 능력
- ③ 특수지능 ④ 유동적 지능

52. 아동심리검사에서 검사자가 취해야 할 면담태도와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 놀이를 통한 면담을 할 때 검사자보다 아동이 면담을 이끌어 나가도록 해 주는 것이 라포 형성에 도움이 된다.
- ② 행동이 옳은지에 대한 아동의 판단보다 사실에 입각한 정보수집이 더 중요하다.
- ③ 유아에 관한 정보를 얻을 때는 짧은 면담과 관찰회기를 여러 번 반복하는 것이 필요하다.
- ④ 미래에 대한 생각이나 포부 등에 관해서는 보호자의 보고에 기초해야 한다.

53. Rorschach 검사 실시에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 좌석의 배치는 검사자가 피검사자와 정면으로 얼굴을 대면하지 않는 것이 좋다.
- ② 잉크 반점이 무엇처럼 보이는지 정도로 질문하고 세부적인 설명은 하지 않는다.
- ③ 상황에 따라서 도판의 제시 순서를 변경하는 것이 권장된다.
- ④ 피검사자가 편안하게 느껴야 다양한 반응이 표현될 수 있다.

54. 심리검사 점수를 해석할 때 고려해야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 개별 문항의 변별도 ② 검사점수의 신뢰구간
- ③ 검사점수의 표준오차 ④ 규준집단의 특성

55. TAT결과를 요구-압력 분석법으로 해석할 때 해석에 관련되는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 배경의 시대적 특징
- ② 주인공의 욕구
- ③ 환경으로부터의 압력
- ④ 대상에 대한 주인공의 감정부착

56. 다음은 어떤 검사에 대한 설명인가?

- 1959년 Dunn부부에 의해 개발되었다.
- 동일한 L과 M 양식으로 구성되어 있고 문제 및 채점양식이 동일하며 그 기준표도 동일한 검사이다.
- 피검사자에게 문제마다 그림을 보여주며 시행한다.
- 검사자는 한 단어를 말해주고 피검사자는 그에 적당한 답을 지적하거나 선택을 표시한다.
- 지시에 따라 한 가지 그림을 지적하면 되기 때문에 말과 특별한 기술이 요구되지 않는 언어 발달을 평가하는 아동용 검사이다.

- ① 피바디 그림 어휘검사(Peabody Picture Vocabulary Test-R : PPVT-R)
- ② 수용-표현언어 척도(Receptive-Expressive Emergents Language Scale : REEL)
- ③ 초기언어 지표검사(Early Language Milestone Scale : ELMS)
- ④ 언어학습능력 진단검사(Illinois Test of Psycholinguistics Abilities : ITPA)

57. Wechsler 아동지능검사의 소검사와 측정내용을 짝지은 것으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 불안 - 숫자 외우기, 산수문제
- ② 추상적 사고 - 공통성 문제, 어휘문제
- ③ 사회적 이해 - 이해문제, 차례맞추기
- ④ 정신운동속도 - 기호쓰기, 모양맞추기

58. 참여관찰법의 특징과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 광범위한 문제행동에 적용될 수 있다.
- ② 출현빈도가 낮은 행동의 평가에 유용하다.
- ③ 관찰자 선입견의 영향을 배제하기가 용이하다.
- ④ 관찰자와 피관찰자의 상호작용이 관찰에 영향을 줄 수 있다.

59. 임상심리 검사의 해석과 관련된 윤리적 지침에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 임상가는 특정한 해석을 뒷받침할만한 증거가 없는 경우 임상적 경험을 바탕으로 해석한다.
- ② 임상가는 환자에게 도움이 된다고 판단될 경우 환자에게 검사 결과에 대한 해석 뿐만 아니라 해석 오류의 가능성에 대한 정보도 알려주어야 한다.
- ③ 컴퓨터를 이용한 검사에서는 자극조건이 동일하기 때문에 특별히 검사 환경을 고려할 필요가 없다.
- ④ 장애를 가진 수검자와 일반 수검자의 기능을 비교하는 것이 검사의 주목적일 때 일반규준보다 특수규준을 사용한다.

60. MMPI-2를 수행하던 어떤 수검자가 '나는 머리가 자주 아프다'라는 문항을 가리키며 다음과 같이 질문하였다. 이런 질문을 받은 검사자의 응답으로 가장 적합한 것은?

'자주'라는 말의 기준이 몇 회를 의미합니까? 저는 한 달에 한번 정도는 그런 편인데, 그 정도면 '마니다'로 응답해야 할지 '그렇다'에 응답해야 하는지 모르겠습니다. 대략적인 기준을 말씀해 주시겠습니까?

- ① '자주'라는 말은 일반적으로 최근 일주일에 1회 정도를 의미합니다.
- ② 자신이 생각하는 기준으로 알아서 판단하여 응답해 주십시오.
- ③ 응답하기가 정 애매하면 응답하지 않고 지나가도 됩니다.
- ④ 실제로 한 달에 한번 머리가 아픈 것이므로 '예'라고 응답해야 합니다.

4과목 : 고급임상심리학

61. 생물학적 관점에서 정신불열증과 관련이 있다고 여겨지는

신경전달물질은?

- ① 세로토닌(seotonin)
- ② 도파민(dopamine)
- ③ 노르에피네프린(norepinephrine)
- ④ GABA(gamma amino butyric acid)

62. 지역사회 정신건강운동에서 추구하는 활동과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정신병원 이외 사회의 여러 영역에서 정신건강 서비스 제공
- ② 정신질환의 예방을 강조하는 방향으로 정책 변화
- ③ 지역사회에 기반을 둔 사회적응훈련 강화
- ④ 임상심리학자의 개업활동 강화

63. 법정에서 임상심리사가 재판에 출정하여 의뢰받는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 범죄 당시 피고인의 정신상태에 대한 평가
- ② 재판상황을 견뎌 낼 수 있는 능력에 대한 자문
- ③ 자신을 변호할 수 있는 능력에 대한 평가
- ④ 피의자의 성격특성을 감안한 양형 기준의 고려사항 평가

64. 일반적으로 임상심리학 분야에서 시행되는 자문의 모델과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조직모델
- ② 조직옹호모델
- ③ 과정모델
- ④ 인지모델

65. 라포 형성의 의미와 역할에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 라포는 치료자 혹은 평가자와 환자 간의 신뢰로운 치료적 관계를 형성하는 것이다.
- ② 라포는 내담자의 성향이나 의뢰 문제가 다양하기 때문에 객관성 확보를 위하여 보다 엄격하고 표준화된 절차에 의하여 시도해야 한다.
- ③ 라포는 환자가 좀 더 솔직하고 정확한 정보를 제공하는 데 도움이 된다.
- ④ 환자의 문제를 다 이해하고 있다는 치료자의 우월적인 태도와 자세는 라포 형성에 큰 장애요인이다.

66. 지능 및 지능평가에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 편차 IQ란 개인의 수행 점수를 개인의 연령집단과 비교하여 산출한 지능지수로 비율 IQ 상 나이가 증가하는 것에 따라 지능이 낮아지는 것을 보완할 수 있다.
- ② 인종에 따라서 지능의 집단차가 보이기 는 하나 이는 인종 간의 우열로 보기보다는 환경적인 문제로 볼 수도 있다.
- ③ IQ점수와 학업 성취와의 상관계수는 0.30 이하로 학업 성취는 지능 이외에 동기, 교사 기대, 문화적 배경, 부모의 태도 등이 더 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.
- ④ 쌍둥이 연구 등에서 나타난 지능의 유전적 영향과 환경적 영향의 문제를 고려할 때 유전적 영향도 상당한 것으로 인정되며 그 설명변량은 약 50% 정도에 이른다는 결과도 있다.

67. 행동평가에서 임상적 판단과 해석을 향상시키는데 가장 적합한 방법은?

- ① 행동평가 시 많은 양의 정보들을 얻게 되므로 적절한 분류와 단순화가 핵심적인 방안이다.
- ② 행동평가는 결국 표본 행동의 획득 및 제한적 정보 수집

을 기초로 하기 때문에 핵심 정보들을 중심으로 집중적 의미를 부여하는 방안이 요구된다.

- ③ 행동평가의 타당성을 확보하기 위하여 충분한 기록을 확보하여야 하며, 가능한대로 충분한 추후조사를 실시하여 기록에 대한 검증과 확인을 거치는 것이 필요하다.
- ④ 행동평가에서 모든 상황과 환경적 요인을 알 수는 없으므로 보다 과도한 추정을 통하여 이를 보완하는 것이 요구된다.

68. 형사법 체계에서 정상적인 법 절차를 집행하기 어려운 사유로 그 성질이 다른 하나는?

- ① 해리성 성격장애환자가 다른 성격 상태에서 범행한 사실을 기억할 수 없는 경우
- ② 정신지체 청소년이 낮은 지능으로 인하여 자신의 범행사실에 대해 정상적인 판단이 어려운 경우
- ③ 장기간의 법적 소송문제로 더 이상 재판을 받기가 어려울 정도의 정신적 혼란을 보이는 경우
- ④ 급성기 정신병 상태에서 범행을 저질러 분명한 범행동기를 밝히기 어려운 경우

69. 심리치료의 초기발전에 기여한 인물과 활동에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① Freud : 정신분석은 의학의 전문분야가 아님을 주장했다.
- ② Dollard 와 Miller : 정신분석 개념과 행동주의 이론의 통합을 모색했다.
- ③ Rogers : 심리치료 과정과 결과에 대한 체계적이고 경적인 연구를 개발했다.
- ④ Lazarus : 치료의 대부분은 엄밀한 행동주의적 요소로 설명될 수 있음을 주장했다.

70. 현상학적 이론에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 왜곡, 부인과 같은 방어기제의 개념을 인정하지 않는다.
- ② 공감, 무조건적인 긍정적 존중, 진솔성과 같은 치료자의 태도를 치료기법보다 더 중요한 것으로 본다.
- ③ 모든 사람은 긍정적 존중에 대한 욕구를 가지고 있다.
- ④ 객관적 진실 이상으로 개인이 주관적으로 느끼는 생각 감정도 중요하다.

71. 대상관계이론의 관점과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자아는 출생에서부터 존재한다.
- ② 리비도는 원초아(이드)의 기능이다.
- ③ 자아는 근본적으로 대상 추구적이다.
- ④ 공격성은 박탈 및 좌절의 결과다.

72. 치료효과에 관한 연구를 수행함에 있어 고려해야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 연구 참여자인 환자의 참여 동기와 연구에 대한 이해여부가 중요한 변인이다.
- ② 실제로 환자 변인 모두를 통제하기는 어렵기 때문에 이에 대한 제한점을 분명히 인지하고 있어야 한다.
- ③ 치료 성과의 측정은 사전에 정의되어 환자 집단과 통제 집단 모두에게 동등하게 적용되는 것이 적절하다.
- ④ 임상사례에 관한 깊이 있는 관찰과 평가는 증상에 대한 세부 정보나 다양한 가설을 획득하기 위해 탄력적으로 시행되어야 한다.

73. 신경심리학에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신경심리학이란 두뇌 기능과 행동 간 관련성에 대한 연구이다.
- ② 두뇌 손상을 일으키는 원인으로는 외상, 독성물질, 퇴행성 질환과 성격장애가 있다.
- ③ 현대 임상신경심리학자는 검사 배터리를 융통성 있게 채택하여 평가한다.
- ④ 신경심리학자들은 진단, 회복의 예후, 개입과 재활에 주요 역할을 감당한다.

74. 두통치료를 돕기 위해 활용되는 행동의학적 기법은?

- ① 이완훈련과 바이오피드백 ② 심리도식치료
- ③ 체계적 둔감법 ④ 역설적 의도법

75. 성격평가도구에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① MMPI : 경험적 준거 방식으로 구성된 검사로서 정신장애나 일반적 성격특성에 이르는 다양한 심리적 특성에 대한 예언적 목적으로 사용되어 왔다.
- ② TAT : 일련의 그림에 대한 반응에서 상상력의 산물을 해석함으로써 내적 갈등, 태도, 목표 등을 평가하는 것으로 상황적 요인이나 문화적 요인의 영향이 적은 도구이다.
- ③ Rorschach test : 대표적인 투사법 검사로서 잉크반점에 대한 반응을 기초로 하여 해석하는 접근으로 신뢰도와 타당도가 의문시되는 면이 있다.
- ④ NEO-PI-R : Goldberg의 5요인 모델에 기초하여 구성된 성격검사로써 합리적-경험적 검사구성 전략에 따라 개발되었다.

76. 심리치료를 종결해야 할 상황과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 치료과정에서 역전이 나타날 경우
- ② 환자가 다른 지역으로 이사하여 지속적인 치료를 받기 어려운 경우
- ③ 치료자가 충분한 지식이나 경험, 기술이 부족하여 더 이상 치료적 관계를 지속할 수 없다고 판단한 경우
- ④ 치료자와 내담자가 최선의 노력을 했지만 더 이상 진전이 없는 고원상태가 지속될 경우

77. 정신분석에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정신분석은 엄격한 자연과학적 검증을 통해서 수립된 심리치료 이론이다.
- ② 자아는 수용할 수 없는 갈등을 담고 있는 충동들이 의식으로 뚫고 들어오려는 위협으로부터 마음을 보호하는 기능을 한다.
- ③ 전이가 잘 형성되지 않는 사람은 정신분석에 적합하지 않다.
- ④ 환자는 전이분석을 통해서 아동기의 무의식적, 환상적 소망이 현재 삶에 끼치는 부정적 영향을 깨닫게 된다.

78. 현대임상심리학의 변화 양상에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 정신역동적 접근을 우선시 하며 고수하는 경향이 지속되고 있다.
- ② 심리치료 연구는 보편적으로 적용 가능한 개입방안 개발을 목표로 하고 있다.
- ③ 행동의학은 상세화할 수 있는 준거 및 효과적인 행동적 개입 방안으로 성장세를 유지하고 있다.
- ④ 심리진단 분야는 임상심리학의 중요한 정체성이며 점점 더 업무비율이 상승하는 추세이다.

79. 면접 때 사용하는 질문 유형에 관한 설명으로 가장 적합한

것은?

- ① “이전에 당신은 이렇게 말했는데..”는 촉진형 질문에 해당한다.
- ② 폐쇄형 질문은 환자의 대화를 독려한다.
- ③ 직면형 질문은 환자의 대답이 이전 내용과 불일치하거나 반문할 때 사용한다.
- ④ 명료형 질문은 환자와 라포를 형성하는데 도움이 된다.

80. 행동치료에서 효과적인 행동계약을 맺기 위한 지침과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 계약된 보상은 정해진 행동이 나타난 즉시 주어져야 한다.
- ② 계약내용이 명확해야 한다.
- ③ 행동계약을 맺을 때 보상기회를 매번 가질 수 있도록 한다.
- ④ 내담자가 한 계약은 정해진 시간 내에 충분히 실행 가능한 것이어야 한다.

5과목 : 고급심리치료

81. 현실치료의 인간관에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 현실치료의 선택이론에 따르면, 인간은 외부의 어떤 힘에 의해 동기화되는 공백 상태로 태어난다.
- ② 인간은 다섯 가지 유전적 욕구(생존, 사랑과 소속, 힘, 자유, 재미)를 가지고 있다.
- ③ 인간은 태어나서 죽을 때까지 행동하며, 행동은 내적동기와 선택의 결과라는 사실을 강조한다.
- ④ 자신의 행동이 선택에 의한 것이라면, 당사자는 그 결과에 대해 책임을 져야 한다.

82. 학습 상담의 단계와 그 단계에서 다루어야 할 내용이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 초기 단계 : 지능검사, 학습방법검사, 학습태도검사, 기초학력검사 등을 실시하였다.
- ② 중기 단계 : 학습 부진의 원인이 되는 자기패배적 악순환을 자각하도록 하였다.
- ③ 중기 단계 : 복습과 연습 계획 및 수업 전략을 수립하였다.
- ④ 종결 단계 : 내담자에게 스스로 학습할 수 있는 능력에 대한 자신감을 심어주었다.

83. Jung의 분석심리학에서 중년기 이후 인격의 발전상태를 의미하는 개념으로서 자기를 향해서 성숙해 나가는 것은?

- ① 개성화 ② 그림자
- ③ 원형 ④ 페르소나

84. 심리치료 효과에 관한 연구들에서 심리치료 효과에 가장 큰 영향을 주는 것으로 소개하는 요소는?

- ① 환자- 치료자 치료동맹
- ② 온화하고 자신에 찬 치료자
- ③ 신념, 희망, 기대와 같은 비특정적 요소들
- ④ 감정의 분출 및 카타르시스

85. 중독문제를 가지고 있는 환자를 돕기 위한 부부치료에서 환자 배우자의 핵심적 주제와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신뢰 ② 공정성
- ③ 중독문제에 대한 낙천적 태도 ④ 자기존중감

86. 노인심리치료에 사용되는 회고요법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 회고요법은 보통 기억, 평가, 종합의 과정을 거친다.
- ② 과거에 대한 회고 작업에서는 과거의 상처 경험보다는 주로 긍정적 측면을 다루는 데 초점을 맞춘다.
- ③ 노인 뿐 아니라 사형수, 젊은 환자들에게도 가능하다.
- ④ 죽음에 임박했다는 생물학적, 심리적 직면에 의해 촉진된다.

87. 주의집중방식의 사회기술훈련에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 사회기술훈련을 원만히 수행하기 위해 적어도 30~90분 정도의 주의집중 능력을 유지하는 것을 목표로 한다.
- ② Liberman의 UCLA 임상연구소에서 개발된 절차로 중증 환자의 주의력 향상에 적용된다.
- ③ 서로 다른 다양한 훈련장면을 연습시키는 방안이다.
- ④ 역할연기, 모델링 및 학습원리에 따른다.

88. 중독에 관한 SBCM 모형(social-behavioral-cognitive moral model)에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 심리적 모형이면서도 중독의 실체를 인정한다.
- ② 대상에 대한 강력한 애착은 정서, 인지적 차원에서 이루어진다.
- ③ 유전적, 생물학적 소질을 고려한다.
- ④ 과도한 중독에는 양가감정이 존재하지 않는다는 관점을 취한다.

89. 성폭력 피해의 가능성이 있는 내담자를 대상으로 상담을 진행할 때 상담자가 유의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상담자가 성폭력 피해문제를 먼저 질문하기보다는 일반적인 질문을 통해 내담자 스스로 말할 기회를 준다.
- ② 상담과 관련해서 모든 내용에 대한 비밀 보장을 약속한다.
- ③ 다른 관련 기관에 의뢰하게 될 때 왜 이런 조치를 하는지에 대해 내담자를 이해시킨다.
- ④ 내담자가 사실을 이야기하지 않는다고 의심하지 말고, 내담자는 자기 보조에 맞춰 최선을 다하고 있음을 받아들이는다.

90. 행동치료의 기본적 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시행방법이 간단하지 않고 복잡적이다.
- ② 쉬운 것에서 어려운 것으로 진행된다.
- ③ 전체 치료 소요시간이 짧다.
- ④ 자기 통제적 접근을 사용한다.

91. 내담자 문제를 평가하는 과정에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 객관적인 평가를 위해 평가의 본질과 목적은 말하지 않는다.
- ② 내담자의 문제를 명확히 파악하기 위해 심리평가가 권장된다.
- ③ 선입견을 배제하기 위해 평가 절차에 대한 설명은 생략한다.
- ④ 내담자 문제의 평가는 반드시 상담자가 직접 한다.

92. 내담자 중심 치료 방법에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것

은?

- ① 정신과적 진단을 피하거나 강조하지 않지만 평가는 중요시 여긴다.
- ② 충고하기, 확인과 설득, 해석하기, 비판하기 등을 피한다.
- ③ 내담자의 자기 결심과 자아 실현 등 긍정적인 측면에 초점을 둔다.
- ④ 실존치료, 로고치료, 게슈탈트 치료 등이 여기에 속한다.

93. 정신사회재활모형에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 장애(disability)의 예 : 취업을 하지 못하고 거주지가 없는 것
- ② 손상(impairment)의 예 : 사회기술의 부족
- ③ 손상(impairment)에 대한 개입 : 병리의 감소 및 제거에 초점을 둔 치료
- ④ 장애(disability)에 대한 개입 : 제도 변화에 초점을 둔 사회적 재활

94. 구조적 가족치료에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 가족의 역기능적인 구조를 개선하는 것이 치료 목적이다.
- ② 가족 내의 삼각관계를 없애는데 초점을 둔다.
- ③ 가족 간의 경계를 명확하게 하는데 초점을 둔다.
- ④ 치료자와의 경험을 통해 가족 구성원 개인의 성장에 초점을 둔다.

95. 다음 사례에서 A씨의 인지적 오류는?

비행기 추락사고가 일어날 확률은 10% 혹은 그 이상이라고 대답한 비행 공포증을 가진 A씨에게 추락사고가 일어날 가능성은 무시할 수 있을 정도로 매우 낮다는 것을 이해시키려고 애썼으나 잘 되지 않았다.

- ① 흑백논리적 사고 ② 개인화
- ③ 임의적 추론 ④ 자기 비하

96. 상담 슈퍼비전에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 슈퍼비전 계약 시 시간요소, 교육구조, 슈퍼비전 구조, 평가 방법 등 세부적인 내용을 명시한다.
- ② 신뢰로운 관계형성과 상호 책임감을 갖도록 슈퍼비전 계약을 명문화 한다.
- ③ 전이 형성을 위해 슈퍼바이저의 학위와 경력은 가급적 노출하지 않는다.
- ④ 객관성 확보를 위해 수련평가도구를 사전에 수련생들에게 고지한다.

97. 상담계획 수립과정에서 치료자가 유의할 사항에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 내담자가 초기에 보이는 불만은 차차 해소되기 때문에 내담자의 불만보다는 긍정적 반응에 초점을 유지한다.
- ② 내담자의 의사전달방식은 언어적 작업인 심리치료에서는 부차적으로 취급되어야 한다.
- ③ 치료는 내담자가 호소하는 문제들을 위주로 진행되어야 한다.
- ④ 내담자의 문제 정의 및 해결방안은 치료의 진행과정에서 작업가설의 형태로 검증되어야 한다.

98. 심리치료에서 내담자의 비언어적 단서에 해당하지 않는 것은?

- ① 시선
- ② 질문의 일부에 대해서 침묵으로 반응하는 것
- ③ 얼굴 표정
- ④ 전반적 외양

99. 자살상담에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 어떤 경우에도 내담자를 존중하는 지지적인 자세를 취한다.
- ② 상담자가 주도적으로 상담을 진행하는 것이 중요하다.
- ③ 자살에 관한 구체적 내용은 안 묻는 것이 좋다.
- ④ 자살은 우울증 이외에 경계선 성격장애에서도 많이 발생한다.

100. 효과적인 해석에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 치료자가 해석을 성급하게 하면 내담자가 방어적 태도를 취한다.
- ② 치료자가 제시한 해석이 내담자의 해석보다 더 중요하다.
- ③ 치료자가 질문을 제기하고 내담자가 스스로 해석하게 만드는 것이 가장 좋다.
- ④ 내담자가 이해할 수 있는 일상언어를 사용할 때 더 잘 받아들여진다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	③	③	①	③	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	④	④	③	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	④	②	①	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	②	②	③	②	①	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	②	③	③	③	④	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	①	①	①	②	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	④	②	③	③	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	①	②	①	①	③	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	①	①	③	②	③	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	③	④	③	③	④	②	③	②