



학교에서 강의를 듣는 학생이 강의를 받던 곳에서 시험을 치르면 강의를 받지 않은 다른 곳에서 시험을 보는 것보다 시험결과가 좋아질 수가 있다.

- ① 처리수준모형                      ② 부호화특정원리
- ③ 재인지역                            ④ 우연학습

15. Piaget의 인지발달단계 중 대상영속성(object permanence)의 발달이 최초로 이루어지는 단계는?

- ① 감각운동기                        ② 전조작기
- ③ 구체적 조작기                    ④ 형식적 조작기

16. 강화계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정비율 계획에서는 매 n번의 반응마다 강화인이 주어진다.
- ② 변동비율 계획에서는 평균적으로 n번의 반응마다 강화인이 주어진다.
- ③ 고정간격 계획에서는 정해진 시간이 지난 후의 첫 번째 반응에 강화인이 주어지고, 강화인이 주어진 시점에서 다시 일정한 시간이 지난 후의 첫 번째 반응에 강화인이 주어진다.
- ④ 변동비율과 변동간격 계획에서는 강화를 받은 후 일시적으로 반응이 중단되는 특성이 있다.

17. 마리아나가 기억에 미치는 영향을 알아보기 위한 연구에서 선행조건인 마리아나의 양은 어떤 변수에 해당하는가?

- ① 독립변수                            ② 종속변수
- ③ 가외변수                            ④ 외생변수

18. 상관계수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 변수간의 연합정도 보다는 변별정도를 나타낸다.
- ② 상관계수의 범위는 0에서 +1까지이다.
- ③ 두 변수 사이의 관계의 강도는 상관계수(y)의 절대치에 의해 규정된다.
- ④ 한 변수가 다른 변수에 영향을 미치는 인과관계를 추론할 수 있다.

19. 의미 있는 "0"의 값을 갖는 측정의 수준은?

- ① 명목측정                            ② 비율측정
- ③ 등간측정                            ④ 서열측정

20. 내분비체계에서 개인의 기분, 에너지 수준 및 스트레스를 해결하는 능력에서 중요한 역할을 하는 것은?

- ① 시상하부                            ② 뇌하수체
- ③ 송과선                                ④ 부신

**2과목 : 이상심리학**

21. DSM-5 에서 다음에 해당하는 지적장애(Intellectual Disability) 수준은?

개념적 영역에서, 학령기 아동과 성인에서는 학업 기술을 배우는데 어려움이 있으며, 연령에 적합한 기능을 하기 위해서는 하나 이상의 영역에서 도움이 필요하다. 사회적 영역에서, 또래에 비해 사회적 상호작용이 미숙하고, 사회적 위협에 대해 제한적인 이해를 한다. 실행적 영역에서, 성인기에는 개념적 기술이 강조되지 않는 일자리에 종종 취업하기도 한다. 지적 장애의 가장 많은 비율이 여기에 해당한다.

- ① 경도(Mild)                            ② 중등도(Moderate)
- ③ 고도(Severe)                        ④ 최고도(Profound)

22. 친밀한 관계에서의 문제, 인지 및 지각의 왜곡, 행동의 괴이성 등을 주요특징으로 보이는 성격장애는?

- ① 조현성 성격장애                    ② 조현형 성격장애
- ③ 편집성 성격장애                    ④ 회피성 성격장애

23. 공황을 경험하거나 움찔달짝 못하게 되었을 때, 도망가기 어렵거나 도움이 가능하지 않은 공공장소나 상황에 있는 것을 두려워하는 불안장애는?

- ① 왜소공포증                            ② 사회공포증
- ③ 광장공포증                            ④ 폐쇄공포증

24. 의사소통장애(communication disorder)에 속하지 않는 것은?

- ① 언어장애(language disorder)
- ② 말소리장애(speech sound disorder)
- ③ 아동기 발병 유창성장애(childhood-onset fluency disorder)
- ④ 탈억제성 사회적 유대감 장애(disinhibited social engagement disorder)

25. 공황장애에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일부 신체감각에 대한 재앙적 사고는 공황장애에서 나타나는 대표적인 인지적 왜곡이다.
- ② 항우울제보다는 항불안제가 공황장애 환자의 치료에 우선적으로 쓰인다.
- ③ 전체 인구의 1/4 이상은 살면서 특정 시점에 한두 번의 공황발작을 경험하는 것으로 알려져 있다.
- ④ 반복적이고 예기치 못한 공황발작이 특징적이다.

26. Young에 의해 개발된 것으로, 전통적인 인지치료를 통해 긍정적인 치료효과를 보지 못했던 만성적인 성격문제를 지닌 환자와 내담자를 위한 치료법은?

- ① 심리도식 치료(schema therapy)
- ② 변증법적 행동치료(dialectical behavior therapy)
- ③ 마음챙김에 기초한 인지치료(mindfulness-based cognitive therapy)
- ④ 통찰 중심치료(insight focused therapy)

27. 다음 사례와 같은 성격장애는?

자신이 관심의 중심에 있기를 바라고, 감정이 빠르게 변하고 피상적이며, 지나치게 인상에 근거한 언어 표현을 보이고, 피암시성이 높은 특성을 보인다.

- ① 편집성 성격장애      ② 연극성 성격장애
- ③ 자기애성 성격장애    ④ 강박성 성격장애

28. 뇌에서 발견되는 베타 아밀로이드라는 단백질의 존재와 가장 관련이 있는 장애는?
- ① 파킨슨병                ② 조현병
  - ③ 알츠하이머병         ④ 주요우울장애

29. 다음에서 설명하고 있는 조현병 유발요인에 해당하는 것은?

부모의 상반된 의사전달, 감정과 내용이 불일치하는 의사소통방식 등이 조현병의 원인이 될 수 있다.

- ① 조현병을 유발하기 쉬운 어머니의 양육태도 (schizophrenogenic mother)
- ② 이중구속이론(double-bind theory)
- ③ 표현된 정서(expressed emotion)
- ④ 분열적 부부관계(marital schism)

30. Beck의 우울 이론 중 부정적 사고의 세 가지 형태에 해당하지 않는 것은?
- ① 과거에 대한 부정적 사고
  - ② 자신에 대한 부정적 사고
  - ③ 미래에 대한 부정적 사고
  - ④ 주변환경(경험)에 대한 부정적 사고

31. 공포증의 형성 및 유지에 대한 2요인 이론은 어떤 요인들이 결합된 이론인가?
- ① 학습 요인과 정신분석 요인
  - ② 학습 요인과 인지 요인
  - ③ 회피 조건형성과 준비성 요인
  - ④ 고전적 조건형성과 조작적 조건형성

32. 알콜 중독과 비타민 B(티아민) 결핍이 결합되어 만성 알콜 중독자에게 발생하는 장애로, 최근 및 과거 기억을 상실하고 새로운 정보를 학습하지 못하는 인지손상과 관련이 있는 것은?
- ① 뇌전증                    ② 혈관성 신경인지장애
  - ③ 헌팅턴병                ④ 코르사코프 증후군

33. 정신분석학적 관점에서 볼 때 해리장애를 야기하는 주된 방어기제는?
- ① 억압                      ② 반동형성
  - ③ 치환                      ④ 주지화

34. 조현병의 진단기준에 해당하는 증상이 아닌 것은?
- ① 망상                      ② 환각
  - ③ 고양된 기분            ④ 와해된 언어

35. 주의력결핍 및 과잉행동 장애(ADHD)의 치료에 사용되는 약물은?
- ① Ritalin                    ② Thorazine

- ③ Insulin                    ④ Methadone

36. 특정공포증의 하위유형 중 공포상황에서 초반에 짧게 심박수와 혈압이 증가된 후 갑자기 심박수와 혈압의 저하가 뒤따르고 그 결과 실신하거나 실신할 것 같은 반응을 경험하는 것은?
- ① 동물형                    ② 상황형
  - ③ 자연환경형            ④ 혈액-주사-손상형

37. 기분관련장애와 관련된 유전가능성에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 유전가능성은 양극성 장애보다 단극성 장애에서 더 높다.
  - ② 유전가능성은 단극성 장애보다 양극성 장애에서 더 높다.
  - ③ 유전가능성은 단극성 장애와 양극성 장애에서 유사하다.
  - ④ 단극성 장애와 양극성 장애는 유전가능성과 관련이 없다.

38. 외상후 스트레스 장애의 주된 증상과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 침습증상                ② 지속적인 회피
  - ③ 과도한 수면            ④ 인지와 감정의 부정적 변화

39. DSM-5에서 주요우울장애의 주 증상에 포함되지 않는 것은?
- ① 정신운동성 초조나 지체
  - ② 불면이나 과다수면
  - ③ 죽음에 대한 반복적인 생각
  - ④ 주기적인 활력의 증가와 감소

40. DSM-5에서 성별 불쾌감에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 성인의 경우 반대 성을 지닌 사람으로 행동하며 사회에서 그렇게 받아들여지기를 강렬하게 소망한다.
  - ② 태어나면서 정해진 출생 성별과 경험하고 표현하는 성별 사이에 뚜렷한 불일치를 보인다.
  - ③ 아동에서부터 성인에 이르기까지 다양한 연령대에서 나타날 수 있다.
  - ④ 동성애자들이 주로 보이는 장애이다.

3과목 : 심리검사

41. 지능의 개념에 관한 연구자와 주장의 연결이 틀린 것은?
- ① Wechsler - 지능은 성격과 분리될 수 없다.
  - ② Horn - 지능은 독립적인 7개 요인으로 이루어져 있다.
  - ③ Cattell - 지능은 유동적 지능과 결정화된 지능으로 구분할 수 있다.
  - ④ Spearman - 지적 능력에는 g요인과 s요인이 존재한다.

42. MMPI-2의 형태분석에서 T 점수가 65 이상으로 상승된 임상척도들을 묶어서 해석하는 것은?
- ① 코드유형(code type)
  - ② 결정문항(critical items)
  - ③ 내용척도(content scales)
  - ④ 보완척도(supplementary scales)

43. 정신연령(mental age) 개념상 실제 연령이 10세인 아동이





- ② 피해자와 가해자의 평소 친분관계
- ③ 목격자 증언의 신빙성
- ④ 범행 당시 가해자의 정신상태

75. 다음 사례에서 사용한 치료적 접근은?

불안을 갖고 있는 내담자를 치료하는 과정에서 체계적 둔감법을 사용하였고, 공황을 느끼고 있는 내담자에게 참여 모델링 기법을 사용했다.

- ① 행동적 접근                      ② 정신분석적 접근
- ③ 실존주의적 접근                ④ 현상학적 접근

76. 상담자가 자신의 내담자와 치료를 진행하는 기간에 내담자 가족에게 식사초대를 받아 식사를 했다면 어떤 윤리원칙을 위반할 가능성이 높은가?

- ① 유능성                              ② 이중관계
- ③ 전문적 책임                      ④ 타인의 존엄성에 대한 존중

77. 심리평가를 시행하는 동안 임상심리사가 취해야 할 태도와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 행동관찰에서는 비밀상적 행동이나 그 한자만의 특징적인 행동을 주로 기술한다.
- ② 관찰된 행동을 기술할 때 구체적인 용어로 설명하는 것이 바람직하다.
- ③ 평가상황에서의 일상적인 행동을 평가보고서에 기록하는 것이 좋다.
- ④ 심리검사 결과뿐만 아니라 외모나 면접자에 대한 태도, 의사소통방식 등도 기록하는 것이 좋다.

78. 임상적 평가의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 치료의 효과에 대한 예측(예후)
- ② 미래 수행에 대한 예측
- ③ 위험성 예측
- ④ 심리 본질의 발견

79. 아동의 바람직하지 않은 행동을 감소시키기 위해 사용할 수 있는 적합한 기법은?

- ① 행동연쇄(Chaining)
- ② 토큰경제(Token economy)
- ③ 과잉교정(Overcorrection)
- ④ 주장훈련(Assertive training)

80. 행동평가에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 목표행동을 정확히 기술한다.
- ② 행동의 선행조건과 결과를 확인한다.
- ③ 법칙정립적(nomothetic) 접근에 기초한다.
- ④ 특정상황에 대한 개인의 행동에 초점을 맞춘다.

**5과목 : 심리상담**

81. 진로지도 및 진로상담의 일반적인 목표와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 내담자 자신에 관한 보다 정확한 이해를 높인다.
- ② 합리적인 의사결정능력을 높인다.
- ③ 일과 직업에 대한 올바른 가치관을 형성하는데 도움을

준다.

- ④ 이미 선택한 진로에 대해 후회하지 않도록 유도한다.

82. 사회 공포증 치료에서 지금까지 피해왔던 상황을 더 이상 회피하지 않고 직면하게 하는 행동수정 기법은?

- ① 노출훈련
- ② 역할연기
- ③ 자동적 사고의 인지재구성 훈련
- ④ 역기능적 신념에 대한 인지재구성 훈련

83. 주요 상담이론과 대표적 학자들이 바르게 짝지어지지 않은 것은?

- ① 정신역동이론 - Freud, Jung, Kemberg
- ② 인본(실존)주의이론 - Rogers, Frankl, Yalom
- ③ 행동주의 이론 - Watson, Skinner, Wolpe
- ④ 인지치료이론 - Ellis, Beck, Perls

84. 성폭력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성폭력은 성적 자기결정권의 침해이다.
- ② 끝까지 저항하면 강간은 불가능하다.
- ③ 성폭력의 피해자는 여성뿐이다.
- ④ 강간은 낯선 사람에게 의해서만 발생한다.

85. 상담의 일반적인 윤리적 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 자율성(autonomy)                ② 무해성(nonmaleficence)
- ③ 선행(beneficence)                ④ 상호성(mutuality)

86. 문화적으로 다양한 집단이 참여하는 집단상담에서의 기본 전제로 적합하지 않은 것은?

- ① 상담자보다 내담자에 대해서만 기본가정(문화, 인종, 성별 등)을 고려해야 한다.
- ② 모든 인간의 만남은 그 자체가 다문화적이다.
- ③ 사람들의 문화적 배경을 고려해야 한다.
- ④ 지도자는 다문화적 관점을 갖고 있어야 한다.

87. Satir의 의사소통 모형에서 스트레스를 다룰 때 자신의 스트레스를 무시하고 다른 사람에게 힘을 넘겨주며 모두에게 동의하는 말을 하는 의사소통 유형은?

- ① 초이성형                              ② 일치형
- ③ 산만형                                ④ 회유형

88. 다음 대화에서 상담자의 반응은?

내담자 : (흐느끼며) 네, 익지할 사람이 아무도 없어요...  
 상담자 : (부드러운 목소리로) 외롭군요...

- ① 해석                                      ② 재진술
- ③ 요약                                      ④ 반영

89. 병적 도박에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대개 돈의 액수가 커질수록 더 흥분감을 느끼며, 흥분감을 느끼기 위해 액수를 더 늘린다.
- ② 도박행동을 그만두거나 줄이려고 시도할 때 안절부절 못하거나 신경이 과민해진다.
- ③ 병적 도박은 DSM-5에서 반사회성 성격장애로 분류된다.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	③	①	②	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	①	④	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	④	②	①	②	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	③	①	④	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	④	①	①	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	①	②	①	④	④	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	②	①	④	④	②	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	④	①	②	③	④	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	①	④	①	④	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	③	①	②	③	②	③	①	②