

2013년11월07일년 수능(지구과학II) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⑤	①	②	④	③	②	⑤	④	③	⑤
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	④	①	①	③	③	④	⑤	①	⑤	

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.




전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 그림 (가)~(다)는 서로 다른 지질 구조를 나타낸 것이다.



(가) (나) (다)


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. (가)는 단층 구조가 발달되어 있다.
 ㄴ. (나)는 횡압력에 의해 형성되었다.
 ㄷ. (다)는 퇴적이 중단된 시기가 있었다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)는 어느 관측소에서 관측한 지진 기록을, (나)는 주시 곡선을 나타낸 것이다.



(가)

(나)


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. 진파 속도는 P파가 S파보다 빠르다.
 ㄴ. 관측소는 이 지진의 암영대에 위치한다.
 ㄷ. 관측소는 진앙으로부터 3000km 떨어져 있다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림은 엘니뇨가 나타나지 않았을 때 태평양 적도 부근 해수의 연직 단면을 나타낸 모식도이다.




엘니뇨 시기에 일어나는 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

- ㄱ. A해역의 해수면은 높아진다.
 ㄴ. B해역에서 수온 약층의 깊이가 깊어진다.
 ㄷ. 무역풍이 강해진다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

4. 그림은 마그마의 분화 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

- ㄱ. 유문암질 마그마는 현무암질 마그마보다 온도가 낮다.
 ㄴ. 유문암질 마그마에서는 현무암질 마그마보다 감람석이 많이 정출된다.
 ㄷ. 유문암질 마그마는 현무암질 마그마보다 색깔이 밝은 암석이 된다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 허블의 법칙에 따라 팽창하는 우주의 모습을 나타낸 풍선 모형이다. 풍선 표면에 고정시킨 단추 A, B, C는 은하를, 물결 무늬(~)는 우주 배경 복사를 나타낸다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉


- ㄱ. 풍선 표면의 A, B, C는 서로 멀어진다.
 ㄴ. 풍선 표면의 중심은 B의 위치에 있다.
 ㄷ. 우주가 팽창하면 우주 배경 복사의 파장이 길어진다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)와 (나)는 각각 현무암과 편마암 중 하나이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. (가)는 편마암이다.
 ㄴ. (나)는 엽리 구조가 발달되어 있다.
 ㄷ. (나)는 접촉 변성 작용을 받아 생성된 것이다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림은 쿠릴 열도 주변의 판경계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]


〈보기〉

- ㄱ. 쿠릴 열도는 북아메리카 판이 태평양 판 아래로 섭입하여 형성되었다.
 ㄴ. 쿠릴 열도에는 해령 지역에 비해 안산암이 많이 분포한다.
 ㄷ. 쿠릴 열도는 호상 열도이다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ

- ⑤ ㄴ, ㄷ


8. 그림은 내부 물질의 분포가 균질한 지구 타원체 상의 한 점 P에 작용하는 만유인력, 원심력, 중력의 관계를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? [3점]

- ① A의 크기는 위도에 관계없이 일정하다.
 ② B는 중력이다.
 ③ 적도에서는 B와 C의 크기와 방향이 같다.
 ④ 단진자의 진동 주기는 고위도로 갈수록 짧아진다.
 ⑤ 중력의 크기는 위도 45°에서 최댓값을 가진다.

9. 그림은 해령으로부터의 거리에 따른 지각 열류량과 지형의 연직 단면을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. 지각 열류량은 해구 근처에서 가장 낮다.
- ㄴ. A에서 지각 열류량이 높은 것은 마그마 상승에 의한 것이다.
- ㄷ. 해양 지각은 대륙 지각보다 방사성 원소의 함량이 많다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림 (가)와 (나)는 전파 은하 M87을 각각 가시광선과 전파로 관측한 영상이다.



(가) 가시광선 영상

(나) 전파 영상


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. 이 은하는 강한 전파를 방출한다.
- ㄴ. 중심핵에서는 물질이 분출되고 있다.
- ㄷ. 이 은하를 모양에 따라 분류하면 타원 은하에 해당한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 어느 해파가 진행할 때 물 입자 운동을 나타낸 것이다.




이 해파에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 이 해파의 연직 방향의 축척은 과장되어 있다.)

— < 보 기 > —

- ㄱ. 해파는 서쪽으로 진행한다.
- ㄴ. 해파의 속도는 수심의 영향을 받지 않는다.
- ㄷ. 해파가 수심이 얇은 곳으로 진행하면 파장은 짧아진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 그림은 북반구 상층의 편서풍 파동과 지상의 등압선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

- ㄱ. 공기는 A에서 수렴하고, B에서 발산한다.
 ㄴ. C에는 상승 기류가, D에는 하강 기류가 발생한다.
 ㄷ. 500hPa 등압면의 고도는 ㉠ 지점이 ㉡ 지점보다 높다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 우리나라 주요 지층과 암석의 분포를 나타낸 지체 구조도이다.



지역 A~D에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. B에는 주로 중생대의 화강암이 분포한다.
 ㄴ. D에는 해성층이 분포한다.
 ㄷ. C의 퇴적암은 A의 변성암보다 먼저 생성되었다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 성단 (가)와 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 태양의 색지수는 0.6 이다.) [3점]

〈보기〉

- ㄱ. (가)를 구성하는 대부분의 별은 중심부에서 수소 핵융합 반응을 한다.
 ㄴ. 성단의 나이는 (가)가 (나)보다 많다.
 ㄷ. 태양보다 질량이 큰 주계열성이 성단에서 차지하는 개수의 비율은 (가)가 (나)보다 높다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 어느 지역의 지질도이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- 等高선 —지층 경계선
- 〈보기〉
- ㄱ. B지층의 주향은 NS이다.
 - ㄴ. B지층의 경사는 45°E이다.
 - ㄷ. D지층과 E지층은 부정합 관계이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 별 (가)와 (나)를 관측하여 별빛의 에너지 세기를 파장에 따라 나타낸 것이다. 두 별은 분광형과 절대 등급, 거리가 같고 별 (나)로부터 오는 빛만 성간 물질의 영향을 받았다.




별 (나)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- 별 (가) —별 (나)
- 파장→
- 〈보기〉
- ㄱ. 성간 소광 때문에 겉보기 등급은 (가)보다 크다.
 - ㄴ. 성간 적색화 때문에 색지수는 (가)보다 크다.
 - ㄷ. 연주 시차는 (가)보다 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)와 (나)는 서로 다른 날 기온이 30°C인 공기 덩어리가 산을 넘으면서 구름이 생성되는 것을 각각 나타낸 것이다.



(가)가 (나)보다 큰 값을 가지는 물리량만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 건조 단열 감률은 1.0°C/100m, 습윤 단열 감률은 0.5°C/100m, 이슬점 감률은 0.2°C/100m이다.) [3점]

- 〈보기〉
- ㄱ. A 지점에서의 상대 습도
 - ㄴ. B 지점에서의 이슬점
 - ㄷ. 상승 응결 고도에서의 공기 덩어리의 온도

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ




전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

18. 그림은 북대서양 서안의 수온 연직 분포와 이로부터 계산된 해수면의 높이를 나타낸 것이다.



지점 A~E의 해수에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 수온의 영향만을 고려할 때 밀도는 B가 D보다 작다.
- ㄴ. 지형류가 흐르는 방향은 A와 C가 같다.
- ㄷ. 해수에 작용하는 전향력의 방향은 C와 E가 같다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 위도가 다른 두 지역 (가)와 (나)에서 부는 바람의 방향 (→)을 나타낸 것이다. 지점 A~D에서 공기에 작용하는 기압 경도력의 크기는 같고, A와 B에는 지균풍이 불고 있다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

- ㄱ. (가)는 남반구, (나)는 북반구 지역이다.
- ㄴ. 지균풍의 풍속은 B가 A보다 빠르다.
- ㄷ. C와 D 모두에서 마찰력과 전향력의 방향은 서로 수직이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ