

2015년06월04일년 수능(생명과학I) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⑤	⑤	⑤	④	③	③	②	③	③	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	④	①	⑤	①	②	②	④	①	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 그림은 서식 환경에 따른 두 토끼의 생김새를 나타낸 것이다.



사막 지역




북극 지역

이 자료에 나타난 생명 현상의 특성과 가장 관련이 깊은 것은?


- ① 효모는 출아법으로 번식한다.
 ② 미모사의 입을 건드리면 입이 접힌다.
 ③ 장구벌레는 번데기 시기를 거쳐 모기가 된다.
 ④ 지렁이에 빛을 비추면 어두운 곳으로 이동한다.

⑤ 선인장은 잎이 가시로 변해 건조한 환경에 살기에 적합하다.

2. 그림은 사람의 소화계와 배설계의 일부를 각각 나타낸 것이다. A~C는 각각 간, 이자, 콩팥 중 하나이다.



소화계



배설계


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. A에서 요소가 생성된다.
 ㄴ. B는 이자이다.
 ㄷ. C는 항이노 호르몬의 표적 기관이다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)는 사람의 체내에서 포도당이 세포 호흡을 거쳐 최종 분해 산물로 되는 과정을, (나)는 체내에서 포도당이 글리코젠으로 되는 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. (가)에는 효소가 필요하다.
 ㄴ. (가)에서 방출된 에너지 중 일부는 체온 유지에 이용된다.
 ㄷ. (나)에서는 동화 작용이 일어난다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 사람의 위와 그 구성 조직을, 표는 위를 구성하는 여러 조직의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 결합 조직과 상피 조직 중 하나이다.



조직	특징
A	위의 표면이나 안쪽 벽을 덮고 있다.
B	조직을 연결시키거나 지지한다.
신경 조직	뉴런으로 구성되며 자극을 전달한다.
근육 조직	근육 섬유로 이루어져 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- ㄱ. A는 소화 효소를 분비하는 기능이 있다.
 ㄴ. B는 결합 조직이다.
 ㄷ. 위는 동물의 구성 단계 중 조직계에 해당한다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

5. 그림은 동물 세포의 구조를 나타낸 것이다.



세포 소기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. A는 단백질을 운반하여 세포 밖으로 분비한다.
- ㄴ. B에는 유전 물질이 들어 있다.
- ㄷ. C는 세포 분열 시 방추사 형성에 관여한다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 염색체의 구조를, (나)는 체세포의 세포 주기를 나타낸 것이다. ㉠~㉢는 각각 G₁, G₂, M기 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. ㉠의 기본 단위는 아미노산이다.
- ㄴ. ㉡이 ㉢으로 응축되는 시기는 ㉠ 시기이다.
- ㄷ. 세포 1개 당 DNA 양은 ㉢ 시기 세포가 ㉠ 시기 세포의 2배이다.

① ㄱ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 어떤 사람의 백혈구 ①의 핵형 분석 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— < 보 기 > —

- ㄱ. ①은 감수 1분열 중기의 세포이다.
- ㄴ. 이 사람은 클라인펠터 증후군의 염색체 이상을 보인다.
- ㄷ. 이 핵형 분석 결과에서 페닐케톤뇨증 여부를 알 수 있다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 유전자형이 AaBb 인 G_1 기의 어떤 세포 P로부터 생식 세포가 형성되는 과정에서 나타나는 세포 ①~④의 세포 1개 당 대립 유전자 A와 B의 DNA 상대량을 나타낸 것이다. A와 a, B와 b는 각각 서로 대립 유전자이다. ①~④의 순서는 세포 분열의 순서와 관계 없으며, ④은 중기의 세포이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

〈보기〉

- ㄱ. ①과 ②은 감수 1분열 완료 시 생성된다.
 ㄴ. P에서 A와 B는 연관되어 있다.
 ㄷ. 세포의 핵상은 ①과 ④에서 같다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

9. 그림은 위에 연결된 자율 신경 X와 Y를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

- ㄱ. X와 Y는 모두 말초 신경계에 속한다.
 ㄴ. X에 역치 이상의 자극을 주면 X의 신경절 이후 뉴런의 축삭 돌기 말단에서 아세틸콜린이 분비된다.
 ㄷ. Y의 신경절 이전 뉴런의 신경 세포체는 연수에 있다.

① ㄱ


② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 생태계에서 일어나는 질소 순환 과정의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

- ㄱ. 뿌리혹박테리아는 과정 (가)에 작용한다.
 ㄴ. 과정 (나)는 질소 동화 작용을 나타낸다.
 ㄷ. 과정 (다)에서 탈질소 세균(질산 분해 세균)이 작용한다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

14. 그림은 구분 기준 A와 B에 따라 사람의 여러 질병을 구분하는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- 〈보기〉
- ㄱ. '감염성 질병인가?' 는 A에 해당한다.
 - ㄴ. '병원체는 독립적으로 물질대사를 하는가?' 는 B에 해당한다.
 - ㄷ. 결핵 치료 시에는 항생제를 사용한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


 전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)

 전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

15. 다음은 골격근의 수축 과정에 대한 자료이다.

○ 표는 골격근 수축 과정의 두 시점 ㉠과 ㉡일 때 근육 원섬유 마디 X의 길이를, 그림은 ㉡일 때 X의 구조를 나타낸 것이다. X는 좌우 대칭이다.

시점	X의 길이(μm)
㉠	2.4
㉡	3.2



○ ㉠은 X에서 액틴 필라멘트와 마이오신 필라멘트가 겹치는 두 구간 중 한 구간이다.


○ ㉡일 때, A대의 길이는 1.6μm이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- 〈보기〉
- ㄱ. 구간 ㉠의 길이는 ㉡일 때보다 ㉠일 때가 0.4μm 더 길다.
 - ㄴ. ㉠일 때 H대의 길이는 0.6μm이다.
 - ㄷ. ㉡에서 ㉠로 될 때 액틴 필라멘트의 길이는 짧아진다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 그림은 어떤 동물에서 정상 핵형을 가진 수컷의 세포 (가)와 염색체 구조 이상이 일어난 암컷의 세포 (나) 각각에 들어 있는 상염색체와 성염색체를 한 쌍씩 나타낸 것이다. A와 a는 서로 대립 유전자이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 염색체 구조 이상은 1 회만 일어났으며, 제시된 자료 이외의 염색체와 돌연변이는 고려하지 않는다.)

- 〈보기〉
- ㄱ. ㉠과 ㉡은 상동 염색체이다.
 - ㄴ. (나)에는 중복이 일어난 염색체가 존재한다.
 - ㄷ. (나)에는 성염색체에 있는 대립 유전자 a가 상염색체로 전좌된 염색체가 있다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

17. 다음은 초파리($2n=8$)의 눈 색 유전에 대한 자료이다.

- 초파리의 눈 색은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 결정되며, 붉은 눈 유전자는 흰 눈 유전자에 대해 완전 우성이다.
- 초파리의 눈 색 유전자는 X 염색체에 존재한다.
- (가)는 성염색체에 따른 초파리의 성별을 나타낸 것이고, (나)는 ①붉은 눈 수컷과 ②흰 눈 암컷을 교배하여 얻은 자손(F_1)의 표현형, 개체수, 염색체 수를 나타낸 것이다.

성염색체	성별	F_1 의 표현형	개체수	염색체 수
XX	암컷	① 흰 눈 수컷	1984	8
XY	수컷	② 붉은 눈 암컷	2016	8
X	수컷	③ 흰 눈 암컷	2	?
XXY	암컷	④ 붉은 눈 수컷	3	?

(가)

(나)

- 초파리의 성별은 Y 염색체와는 상관없이 X 염색체 수에 의해 결정된다. 수컷은 X 염색체가 1개이고, 암컷은 X 염색체가 2개 이상이다.
- (나)에 제시된 F_1 의 상염색체는 모두 정상이다.

이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ①과 ②의 교배 과정에서 일어난 염색체 비분리 이외의 돌연변이는 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. F_1 의 ①과 ②를 교배하여 자손(F_2)을 얻을 때, F_2 의 눈 색 분리비는 붉은 눈 : 흰 눈 = 3 : 1이다.
- ㄴ. ③의 체세포에 들어 있는 염색체 수는 7개이다.
- ㄷ. ④은 ①의 정자와 ②의 성염색체가 없는 난자가 수정되어 태어났다.

① ㄱ

② ㄷ


③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 생물 다양성의 3 가지 의미 중 종 다양성에 대한 자료이다.

- 어떤 지역의 종 다양성은 종의 수가 많을수록, 전체 개체수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등할수록 높아진다.
- 그림은 면적이 같은 서로 다른 지역 (가)와 (나)에 서식하는 식물 종 A~D를 나타낸 것이다.



(가)

(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A~D 이외의 종은 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. 식물의 종 다양성은 (나)보다 (가)에서 높다.
- ㄴ. D의 개체군 밀도는 (가)와 (나)에서 같다.
- ㄷ. 같은 종의 달팽이에서 껍데기의 무늬와 색깔이 다양하게 나타나는 것은 종 다양성에 해당한다.

① ㄱ


② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

19. 그림 (가)는 신경 A~C를, (나)는 (가)의 P 지점에 역치 이상의 자극을 동시에 1회씩 준 후, Q 지점에서의 막전위 변화를 나타낸 것이다. (나)의 I~III은 각각 A~C의 막전위 변화 중 하나이다. t_1 과 t_2 는 I~III에서 같은 시점을 나타낸다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— <보기> —

- ㄱ. 시냅스 소포는 ③보다 ⑤에 많다.
 ㄴ. 구간 ㉠에서 K^+ 의 농도는 세포 안보다 세포 밖이 높다.
 ㄷ. C의 막전위 변화는 (나)의 II에 해당한다.

① ㄱ

② ㄴ


③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 어떤 집안의 유전병 ㉠과 ㉡에 대한 자료이다.

- ㉠과 ㉡을 결정하는 유전자는 같은 염색체에 존재한다.
 ○ ㉠과 ㉡은 각각 대립 유전자 A와 A*, B와 B*에 의해 결정되며, 각 대립 유전자 사이의 우열 관계는 분명하다.



- 가계도 구성원의 핵형은 모두 정상이다.
 ○ 1과 2는 각각 ㉠에 대한 A와 A* 중 한 종류만 가지고 있다.
 ○ 가계도 구성원 중 5가 태어날 때만 1과 2의 감수 분열 과정에서 염색체 비분리가 각각 1회씩 일어났고, 5는 1의 정자 ③과 2의 난자 ⑤가 수정되어 태어났다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 제시된 염색체 비분리 이외의 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.) [3점]

— <보기> —

- ㄱ. ㉠은 열성 형질이다.
 ㄴ. ③가 형성될 때 염색체 비분리는 감수 1분열에서 일어났다.
 ㄷ. 3과 4 사이에서 아이가 태어날 때, 이 아이에게서 ㉠과 ㉡이 모두 나타날 확률은 $\frac{1}{8}$ 이다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ