

2013년06월05일년 수능(생명과학II) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⑤	①	①	⑤	②	②	①	⑤	③	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	⑤	①	③	④	②	③	⑤	④	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!




【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 그림 (가)와 (나)는 각각 세균과 식물 세포 중 하나를 나타낸 것이다.



(가)



(나)


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

- ㄱ. (가)에는 액포가 있다.
 ㄴ. (나)는 세균이다.
 ㄷ. (가)와 (나)에는 리보솜이 있다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


2. 그림은 동물 세포의 일부를 확대하여 나타낸 것이다.



A~C에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 리보솜이다.
 ② B에서 DNA복제가 일어난다.
 ③ B에서 리보솜 RNA(rRNA)가 만들어진다.
 ④ C는 매끈면 소포체이다.
 ⑤ C에서 광합성이 일어난다.

3. 그림은 태양의 빛에너지가 생명 활동에 이용되기까지의 과정을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 광합성과 세포 호흡 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————


- ㄱ. (가)에서 빛에너지가 화학 에너지로 전환된다.
 ㄴ. (나)에서 O_2 가 발생한다.
 ㄷ. (나)는 엽록체에서 일어난다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Download on the App Store 전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)

GET IT ON Google Play 전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

4. 그림 (가)~(다)는 세포막을 통한 물질의 수송 방식을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

————— < 보 기 > —————

- ㄱ. 백혈구는 (가) 방식으로 세균을 잡아먹는다.
 ㄴ. (나)는 음세포 작용이다.
 ㄷ. 호르몬의 한 종류인 인슐린은 (다) 방식으로 분비된다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 다음은 삼투 현상을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]
 (가) 4개의 동일한 비커에 각각 크기와 무게가 같은 정육면체 모양의 감자 조각을 1개씩 넣는다.
 (나) (가)의 비커에 각각 동일한 양의 증류수, 0.1% NaCl 용액, 0.9% NaCl 용액, 3% NaCl 용액을 넣어 감자 조각이 충분히 잠기도록 한다.
 (다) 2시간 후 (나)의 각 비커에서 감자 조각을 꺼내어 무게를 측정하여 그 변화량을 실험 결과 I ~ IV로 기록한다.

[실험 결과]

구분	I [증류수]	II [0.1% NaCl 용액]	III [0.9% NaCl 용액]	IV [3% NaCl 용액]
감자 무게의 변화량	0.21g 증가	0.18g 증가	변화 없음	0.42g 감소


이 실험 결과에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— <보 기> —

ㄱ. 감자 세포의 팽압은 IV에서가 I에서보다 크다.
 ㄴ. II에서 감자 세포의 흡수력은 감자 세포의 삼투압보다 크다.
 ㄷ. III에서 0.9% NaCl 용액은 감자 세포 내액과 등장액이다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 어떤 효소 반응을 나타낸 것이다. A~C는 주효소, 보조 인자, 기질을 순서 없이 나타낸 것이다.




이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A의 주성분은 단백질이다.)

— <보 기> —

ㄱ. 활성화 에너지는 A가 없을 때가 있을 때보다 작다.
 ㄴ. B의 농도는 반응 후가 반응 전보다 낮다.
 ㄷ. 효소-기질 복합체는 A와 C가 결합한 것이다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 종이 크로마토그래피법으로 시금치 잎의 색소를 분리한 결과를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 엽록소 a와 잔토필 중 하나이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— <보 기> —

ㄱ. 전개율은 카로틴이 ㉠보다 크다.
 ㄴ. ㉠은 광계의 반응 중심 색소이다.
 ㄷ. ㉡은 적색보다 녹색 파장의 빛을 잘 흡수한다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

8. 그림은 사람의 세포에서 일어나는 TCA 회로를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— <보 기> —

ㄱ. 이 회로는 미토콘드리아에서 일어난다.
 ㄴ. 과정 (가)에서 기질 수준 인산화가 일어난다.
 ㄷ. 과정 (나)의 탈수소 효소는 FAD를 환원시킨다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림 (가)는 100 배의 현미경 배율에서 대물 마이크로미터와 접안 마이크로미터의 눈금이 일치된 부분을, (나)는 (가)의 현미경 재물대에 표본을 올려놓고 대물렌즈의 배율만 2 배로 높여 세포를 관찰한 결과를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 대물 마이크로미터 한 눈금의 길이는 10 μ m이다.) [3점]

— < 보 기 > —


- ㄱ. A는 대물 마이크로미터 눈금이다.
 ㄴ. (가)에서 접안 마이크로미터 한 눈금의 길이는 4 μ m에 해당한다.
 ㄷ. 관찰한 세포의 길이(l)는 80 μ m이다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 효소 X에 의한 반응의 초기 반응 속도를 측정한 실험이다.

표와 같은 조건에서 기질의 농도를 변화시키면서 초기 반응 속도를 측정하여 그림과 같은 결과를 얻었다.

조건 실험	X의 농도 (상대값)	저해제
I	1	없음
II	1	있음
III	2	없음




이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 실험 I ~III에서 X의 농도와 저해제의 유무를 제외한 모든 조건은 동일하다.) [3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. I에서 기질과 결합하지 않은 X의 농도는 S_2 에서가 S_1 에서보다 높다.
 ㄴ. II에서 첨가한 저해제는 경쟁적 저해제이다.
 ㄷ. S_1 일 때 효소·기질 복합체의 농도는 III에서가 II에서보다 높다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 그림은 캘빈 회로를 (가)~(다)의 3 단계로 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 G3P의 분자 수이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 3PG는 PGA이고, G3P는 PGAL이다.)

〈보기〉

- ㄱ. CO_2 가 고정되는 과정은 (가)에서 일어난다.
- ㄴ. (나)에서 3PG는 G3P로 환원된다.
- ㄷ. ㉠이 ㉡보다 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 식물의 엽록체에서 명반응에 관여하는 광계 I의 작용을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

- ㄱ. 광계 I은 틸라코이드 막에 존재한다.
- ㄴ. 1차 전자 수용체는 반응 중심 색소로부터 고에너지 전자를 받는다.
- ㄷ. 광계 I은 순환적 광인산화 반응과 비순환적 광인산화 반응에 모두 관여한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 세포 내에서 해당 과정을 거쳐 젖산이나 에탄올이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.




과정 (가), (나), (다)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

〈보기〉

- ㄱ. 산화 환원 효소가 관여한다.
- ㄴ. CO_2 가 생성된다.
- ㄷ. ATP가 생성된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 그림은 어떤 세포의 미토콘드리아 내막에서 ATP 합성이 일어나는 과정과 물질 X의 작용 부위를 나타낸 것이다. 물질 X는 ATP 합성 효소에 결합하여 H^+ 의 이동을 차단한다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. (가)는 미토콘드리아 기질(바탕질)이다.
 ㄴ. 물질 X를 처리하면 (가)의 pH는 처리하기 전보다 높아진다.
 ㄷ. (나)에서 피루브산이 아세틸 CoA로 산화된다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄷ
 ④ ㄱ, ㄴ
 ⑤ ㄴ, ㄷ

15. 그림은 에이버리의 실험을 나타낸 것이다.




이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— < 보 기 > —

- ㄱ. (가)에서 S형균이 R형균으로 형질 전환되었다.
 ㄴ. 형질 전환을 일으키는 물질은 DNA 분해 효소에 의해 파괴된다.
 ㄷ. 열처리하여 죽은 S형균의 세포 추출물에는 형질 전환을 일으키는 물질이 존재한다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 산소의 동위 원소인 ^{18}O 를 이용하여 루벤이 수행한 실험의 일부를 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, ㉠은 광합성에 의해 발생한 기체이다.) [3점]

— <보기> —

- ㄱ. ㉠은 명반응의 순환적 광인산화의 산물이다.
ㄴ. (가)에서 $^{18}\text{O}_2$ 기체가 검출된다.
ㄷ. (나)에서 발생한 O_2 는 C^{18}O_2 가 분해되어 발생한다.

- ① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

17. 그림은 세포 내에서 DNA 복제가 일어나는 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

— <보기> —

- ㄱ. ㉠은 선도 가닥이다.
ㄴ. ㉡은 프라이머이다.
ㄷ. ㉢이 합성될 때 새로운 뉴클레오타이드는 ㉢의 5' 말단에 첨가된다.

- ① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 진핵세포에서 유전자 X의 발현이 조절되어 폴리펩타이드 Y가 만들어지는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

— <보기> —

- ㄱ. 전사 인자에 의한 유전자 발현 조절은 (가)에서 일어난다.
ㄴ. RNA의 가공은 (나)에서 일어난다.
ㄷ. ㉠은 (다)에서 폴리펩타이드 Y로 번역되지 않는다.

- ① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 표는 100 개의 염기쌍으로 이루어진 어떤 2중 나선 DNA의 각 가닥 I 과 II 에 대한 염기 조성, 이 두 가닥 중 한 가닥으로부터 정상적으로 전사된 mRNA 가닥의 염기 조성을 나타낸 것이

$$\frac{A+T}{G+C} = \frac{2}{3}$$

다. 이 2중 나선 DNA에서 염기 비율은

구분		염기 조성(개)					
		A	G	T	C	U	계
DNA	I	?	?	17	?	?	100
	II	?	27	?	?	?	100
mRNA		?	㉠	?	?	17	100


이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 주형으로 사용된 DNA 가닥의 모든 염기가 mRNA로 전사되었다.)

— <보기> —

- ㄱ. ㉠은 33이다.
ㄴ. mRNA가 만들어질 때 주형으로 사용된 DNA 가닥은 가닥 I 이다.
ㄷ. 가닥 I 에서 퓨린 계열의 염기는 56개이다.

- ① ㄱ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

20. 그림은 어떤 유전자의 DNA 염기 서열 일부(구간 X)와 이 유전자로부터 전사된 mRNA를 거쳐 합성된 폴리펩타이드에서 구간 X에 해당하는 아미노산 서열을 나타낸 것이다. 그림에서 X에 해당하는 아미노산 서열은 (가), 프롤린, 알라닌 순으로 합성되었고, 표는 유전 암호의 일부이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 합성된 폴리펩타이드는 구간 X의 가닥 I 과 II 중 한 가닥이 전사되어 번역된 것이다.) [3점]

< 보 기 >

- ㄱ. mRNA가 만들어질 때 가닥 I 이 주형으로 사용된다.
 ㄴ. ㉠에 해당하는 염기는 C 이고, ㉡에 해당하는 염기는 G 이다.
 ㄷ. (가)에 해당하는 아미노산을 운반하는 tRNA의 안티코돈은 5'-GGC-3'이다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ