

2014년10월07일년 수능(생명과학II) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 과목 구분 없음	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	③	②	③	③	⑤	⑤	①	②	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	⑤	⑤	①	④	⑤	②	④	①	③

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.




전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 과목 구분 없음 (20문제)

1. 그림은 몇 가지 기준에 따라 세포 소기관을 분류한 것이다. X와 Y는 각각 리보솜과 편모 중 하나이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
 ㄱ. '2중막 구조를 가짐'은 기준 (가)에 해당한다.
 ㄴ. X는 세포 내 소화를 담당한다.
 ㄷ. Y는 세포의 운동에 관여한다.

- ① ㄱ
 ② ㄴ
 ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 그림 (가)는 두 종류의 저해제 ㉠과 ㉡의 작용 원리를, (나)는 저해제의 종류와 첨가 여부를 달리하였을 때 기질 농도에 따른 초기 반응 속도를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 ㉠과 ㉡ 중 하나이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, (나)의 세 경우에서 효소 농도는 일정하고, 저해제의 종류와 첨가 여부를 제외한 반응 조건은 동일하다.)

- < 보 기 >
 ㄱ. A와 기질은 경쟁적으로 효소에 결합한다.
 ㄴ. A가 있는 경우 기질 농도가 X일 때 효소는 기질에 의해 포화된다.
 ㄷ. 기질 농도가 X일 때 ㉡이 있는 경우와 저해제가 없는 경우의 초기 반응 속도는 같다.

- ① ㄱ
 ② ㄷ
 ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ
 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)는 광합성의 명반응 과정에서 일어나는 전자의 이동을, (나)는 암반응 과정을 나타낸 것이다. ㉠ ~ ㉣은 각각 ATP, ADP, NADP⁺ 중 하나이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 경로 A에서 ㉠이 생성되지 않는다.
 - ㄴ. 경로 B에서 ㉣은 전자의 최종 수용체이다.
 - ㄷ. 1분자의 CO₂가 RuBP와 결합하여 2분자의 G3P가 생성되는 과정에서 생성되는 ㉢ 분자 수의 값은 1이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 그림은 식물에서 일어나는 물질대사 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 CO₂와 H₂O 중 하나이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠은 명반응의 전자 전달계에 전자를 공급한다.
 - ㄴ. (가)와 (나)가 진행되는 세포 소기관에서 모두 단백질 합성이 일어난다.
 - ㄷ. TCA 회로를 통해 1분자의 α 케토글루타르산으로부터 옥살아세트산이 생성되는 과정에서 2분자의 ㉡이 방출된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 미토콘드리아에서 일어나는 세포 호흡 과정의 일부를 나타낸 것이다. ㉠ ~ ㉣은 각각 NAD^+ , CO_2 , 조효소 A 중 하나이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 탈탄산 반응을 통해 ㉠이 생성된다.
 - ㄴ. ㉡은 미토콘드리아 내막에서 산화된다.
 - ㄷ. ㉢은 조효소 A이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림 (가)는 생물체 내에서 포도당이 분해되는 경로 I ~ III을, (나)는 I ~ III의 특징을 구분하여 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. '기질 수준 인산화가 일어남'은 ㉠에 해당한다.
 - ㄴ. '산소가 소모되지 않음'은 ㉡에 해당한다.
 - ㄷ. 'NADH가 산화됨'은 ㉢에 해당한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 번역 개시 과정의 일부를 나타낸 것이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)는 P 자리에 있다.
 - ㄴ. 메싸이오닌(Met)은 A 자리로 들어오는 아미노산과 펩타이드 결합을 형성한다.
 - ㄷ. 리보솜이 이동할 때 메싸이오닌과 분리된 (가)는 E 자리로 이동한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 두 가지 이동 방식 A와 B에 의해 물질 X가 세포막을 통과하는 속도를 온도에 따라 나타낸 것이다. A와 B는 각각 단순 확산과 촉진 확산 중 하나이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. A에 ATP가 소모된다.
 - ㄴ. A에 막 단백질이 관여한다.
 - ㄷ. B에 의해 세포막 안팎의 X 농도 차가 커진다.


- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ



전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

9. 그림은 진핵세포의 핵에서 DNA 복제가 일어나는 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. ㉠은 지연 가닥이다.
 - ㄴ. ㉠의 5' 말단에 새로운 뉴클레오타이드가 첨가된다.
 - ㄷ. ㉡에서 염기 사이의 수소 결합은 ㉢에서보다 먼저 형성된다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 다음은 생물 (가)~(다)를 이용한 실험에 대한 자료이다. (가)~(다)는 각각 폐렴균, 붉은빵곰팡이, 콜로렐라 중 하나이다.

- 캘빈은 밀폐된 용기에 (가)를 넣어 배양하면서 방사성 동위 원소로 표지된 이산화 탄소를 공급하여 광합성의 암반응 과정을 밝혔다.
- 그리피스는 생쥐와 (나)를 이용하여 (나)의 세포 내에 있는 어떤 물질이 형질 전환을 일으킨다는 사실을 알아냈다.
- 비들과 데이턴은 (다)의 돌연변이주를 이용한 실험을 통해 1유전자 1효소설을 주장했다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)~(다)는 모두 세포벽을 갖는다.
 - ㄴ. (가)~(다) 중 효모와 유엔 관계가 가장 가까운 생물은 (나)이다.
 - ㄷ. (다)의 핵 내에서 전사가 일어날 때 RNA 중합 효소는 전사 인자의 도움으로 프로모터에 결합한다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

11. (가)는 대장균의 유전자 X로부터 전사된 mRNA 염기 서열의 일부이고, (나)는 유전자 X에 발생한 돌연변이에 대한 설명이다.

(가)	5'- ¹ AUGGUG--- ¹¹⁰ GGGACCAACCGGCC--- ¹²³ -----3' 개시 코돈
(나)	돌연변이로 인해 (가)의 110에서 123번째 사이의 염기 중 1개가 다른 염기로 바뀌었다. 그 결과 생성된 폴리펩타이드의 아미노산 수는 정상보다 적다.

이 돌연변이로 인해 나타나는 변화에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 종결 코돈은 UAA, UAG, UGA이다.) [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. UGA에서 번역이 종결되었다.
 - ㄴ. (가)의 염기 C 중 1개가 U로 바뀌었다.
 - ㄷ. 생성된 폴리펩타이드의 아미노산 수는 39개이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

12. 다음은 형광 유전자를 이용하여 하수 처리장의 용존 산소량을 측정하는 실험 과정을 순서 없이 나타낸 것이다. 이 유전자에 의한 형광 세기는 산소가 많을수록 커진다.


- (가) 플라스미드 A를 잘라 형광 유전자를 넣고 세균에 삽입한다.
- (나) 하수 처리장의 물에 세균을 넣고 형광의 세기를 측정한다.
- (다) ㉠ 형광 유전자가 삽입된 세균을 찾아내어 배양한다.
- (라) 해파리로부터 형광 유전자를 분리한다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 기존의 세균에는 형광 유전자가 없다.)

- < 보 기 >
- ㄱ. (가)에서 제한 효소와 연결 효소가 이용된다.
 - ㄴ. ㉠은 유전자 조작 생물체(GMO)이다.
 - ㄷ. 실험 과정을 순서대로 나열하면 (라)→(가)→(다)→(나)이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 그림은 진핵세포의 유전 정보로부터 단백질이 합성되는 과정을 나타낸 것이다.




이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. 마이오디 단백질에 의한 전사 조절은 (가)에서 일어난다.
 - ㄴ. 젓당 오페론에 의한 조절은 (나)에서 일어난다.
 - ㄷ. 세포질에서 (다)가 일어난다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄱ, ㄷ

14. 그림은 단일 가닥 DNA X의 염기 서열을 분석하는 과정의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 합성 중인 DNA에 ddNTP가 결합하면 DNA 합성이 중단된다.
 - ㄴ. 합성된 DNA를 전기 영동했을 때 ①의 이동 속도가 가장 느리다.
 - ㄷ. 단일 가닥 DNA X의 염기 서열은 5'-AGGTCTCGCA-3'이다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ


15. 다음은 화학 진화설을 확인하기 위한 밀러의 실험에 대해 세 학생이 대화한 내용이다.



밀러의 실험에 대해 옳게 설명한 학생만을 있는 대로 고른 것은?

- ① B
- ② C
- ③ A, B
- ④ A, C
- ⑤ A, B, C


16. 그림은 지구 탄생 이후의 생물 출현과 그에 따른 대기 구성성분의 변화를 나타낸 것이다. ㉠과 ㉡은 각각 O₂와 CO₂ 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① ㉠은 CO₂이다.
- ② A는 다세포 생물이다.
- ③ A는 산소 호흡 생물이다.
- ④ B의 출현 시기는 중생대이다.
- ⑤ B의 흔적은 스트로마톨라이트에서 발견된다.

17. 그림은 동물 5종의 계통수이다. A ~ C는 각각 성게, 가재, 창고기 중 하나이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. A의 체강은 내배엽과 중배엽으로 둘러싸여 있다.
 - ㄴ. C는 연골 어류이다.
 - ㄷ. '원구가 항문으로 분화됨'은 (가)에 해당한다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 다음은 초파리를 이용하여 진화의 요인을 알아보는 실험이다.

- 한 집단의 초파리를 공간을 달리하여 두 집단으로 나누고 한 집단에는 녹말을, 다른 집단에는 엿당을 먹이로 주면서 여러 세대 동안 배양하였다.
- 두 집단을 다시 합쳐 놓았을 때 서로 다른 집단에 속했던 개체들 간의 교배에 비해 같은 먹이를 먹었던 집단 내 개체들끼리의 교배가 더 활발하였고 이러한 경향이 다음 세대에서도 유지되었다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

- < 보 기 >
- ㄱ. 동소적 중분화 과정의 예이다.
 - ㄴ. 두 집단 간 환경의 차이가 진화의 요인으로 작용하였다.
 - ㄷ. 실험 결과 두 집단 사이에 유전자 풀의 차이가 나타났다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 표는 습지 형성 전후 핀치새 집단의 부리 크기 변화에 대한 자료이다. 핀치새는 부리가 클수록 부드러운 씨앗보다 딱딱한 씨앗을 더 잘 먹는다.

구분	먹이의 특징	부리 크기에 따른 개체 수
습지 형성 전	풍부하고 다양함	
습지 형성 후	딱딱하거나 부드러운 2가지 씨앗만 존재함	

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

- < 보 기 >
- ㄱ. 부리 크기에 따라 자연선택이 일어났다.
 - ㄴ. 습지 형성에 의해 방향성 선택이 일어났다.
 - ㄷ. 중간 크기의 부리를 가진 핀치새의 번식률은 습지 형성 전보다 습지 형성 후에 더 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 다음은 어떤 동물의 질병 X에 대한 저항성을 결정하는 유전에 관한 자료이다.

- X에 대한 저항성은 상염색체에 위치하는 한 쌍의 대립 유전자 A와 A*에 의해 결정되며, A는 A*에 대해 완전 우성이다.
- A*는 X에 대한 저항성을 갖게 하는 대립 유전자이다.
- 개체 수가 10000이고 암수의 비율이 동일한 멘델 집단에서 X에 대해 저항성을 갖는 개체는 900마리이다.
- A와 A* 및 이 집단에 속하는 수컷 개체 ㉠이 갖는 X에 대한 저항성 유전자 부위의 DNA 지문은 그림과 같다.

A	A*	개체 ㉠
—	—	—
—	—	—
—	—	—
—	—	—

㉠이 집단 내에서 X에 대한 저항성을 갖지 않는 암컷과 교배하여 자손을 낳을 때, 이 자손이 X에 대한 저항성을 가질 확률은?
[3점]

- ① 3/52
- ② 21/200
- ③ 3/26
- ④ 21/100
- ⑤ 3/13