

2003년08월10일년 시설원예기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 원예학개론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	④	④	④	④	④	④	①	②	③	②
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	④	①	③	①	③	③	③	③	④	②
【2과목 : 20문제】 시설원예학	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	①	②	②	④	②	④	③	④	①
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	③	③	④	③	④	②	①	④	①	④
【3과목 : 20문제】 재배학원론	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	①	④	④	①	①	④	①	③	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	②	③	③	③	①	②	①	①	④	④
【4과목 : 20문제】 작물생리학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	④	③	②	②	①	①	③	②	②	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	②	①	④	③	①	②	③	④	②	④
【5과목 : 20문제】 수경재배학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	①	②	④	①	②	④	③	①	②	③
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	①	③	④	③	②	②	①	②	④	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 원예학개론 (20문제)

1. 다음 중 MM 106 대목의 특성인 것은?

- ① 극왜화성 대목이다.
- ② 발근력, 번식력이 약하다.
- ③ 흡지의 발생이 많다.
- ④ 면충 저항성 대목이다.

2. 생태적 방제법(ecological control method)이 아닌 것은?

- ① 내병, 내충성 품종의 이용
- ② 기주식물(寄主植物)의 제거
- ③ 환경조건 개선으로 건전한 수세 유지
- ④ 점화유살(點火誘殺)

3. 델라웨어의 GA 처리시기와 농도로 가장 효과적인 것은?

- ① 만개기에 150 ppm
- ② 개화전 3일과 10일에 100 ppm
- ③ 개화직전에 2회 150 ppm
- ④ 개화전 13일과 개화후 10일에 100 ppm

4. 다음 수형 중 사과나무 밀식재배에 적합한 정지법은?

- ① 변칙주간형 정지법
- ② 개심자연형 정지법
- ③ 오울백형 정지법
- ④ 방추형 정지법

5. 고울던 딜리셔스에서 선발된 스퍼어 타입의 사과품종은?

- ① 밀러 스퍼(Miller Spur)
- ② 레드 스퍼(Red Spur)
- ③ 스타 크림슨(Star Krimson)
- ④ 고울드 스퍼(Gold Spur)

6. 다음 중 사과나무 하기전정(夏期剪定)의 효과가 아닌 것은?

- ① 수관(樹冠)을 작게 한다.
- ② 광선투과를 높인다.
- ③ 수형구성에 도움이 된다.
- ④ 뿌리의 발달이 좋아진다.

7. 다음 화훼류 중 상대적 단일식물은?

- ① 다알리아, 매리골드
- ② 아스파라거스, 시클라멘
- ③ 카네이션, 팬지
- ④ 히아신스, 제라니움

8. 단일 조건에 의해서 구가 형성되는 것은?

- ① 튜울립
- ② 다알리아
- ③ 수선
- ④ 시클라멘

9. 다음 설명 중 옳지 않는 것은?

- ① 인경은 잎이 변화된 것으로 모구가 소실되고 신구가 형성되는 것도 있다.
- ② 구경류는 대부분의 모구가 소실되고 신구가 형성된다.
- ③ 괴경은 부정형으로 disk가 있다.
- ④ 괴근은 뿌리가 비대된 것이며 crown이 있다.

10. 국화의 차광 재배에서 차광 개시 후 며칠 정도이면 꽃눈이 분화하는가?

- ① 3 ~ 5일
- ② 7 ~ 10일
- ③ 15 ~ 18일
- ④ 20 ~ 23일

11. 글라디올러스의 일반적인 억제 재배 방법은?

- ① 에틸렌 클로로 히드린 처리한다.
- ② 30°C정도의 고온조건으로 재배한다
- ③ 15시간 정도의 장일 조건으로 재배한다.
- ④ 저온 건조 저장으로 정식을 늦게 한다.

12. 큐어링(curing)의 목적은?

- ① 저장 중의 부패 방지
- ② 화아분화 촉진
- ③ 휴면 타파
- ④ 맹아 억제

13. 화훼재배에 있어서 일반적으로 관수량을 줄여야 하는 시기는?

- ① 발아기
- ② 발육기
- ③ 화아분화기
- ④ 개화기

14. 다음 양파의 인경비대에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 고온장일에서 촉진된다.
- ② 만생종 품종은 장일조건보다 고온이 촉진적이다.
- ③ 저온단일에서 촉진된다.
- ④ 조생종은 단일조건에서 촉진된다.

15. 딸기의 화아분화에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 아무리 고온상태라 하더라도 단일처리를 하면 꽃눈이 분화된다.
- ② 딸기의 화아분화는 3~5°C이하에서만 일어난다.
- ③ 아무리 장일상태라 하더라도 저온처리만 충분하면 꽃눈이 분화된다.
- ④ 사철딸기는 보통 딸기보다도 화아분화 온도가 낮다.

16. 채소에서 당질의 소모와 직결되어 일어나는 현상은?

- ① 열근 현상
- ② 기근 현상
- ③ 바람들이 현상
- ④ 비대 발육 현상

17. 다음 채소 중 근계(根系)가 가장 큰 것은?

- ① 시금치
- ② 무
- ③ 토마토
- ④ 파

18. 토란재배에서 복주기(培土)를 하는데 그 주된 목적은 무엇인가?

- ① 연백(軟白)
- ② 도복 방지
- ③ 분구 억제
- ④ 목부분 착색 방지

19. 다음 중 호박의 육묘기간 동안 처리로서 암꽃착생을 촉진하는 처리는?

- ① 고온장일처리
- ② 고온단일처리
- ③ 저온장일처리
- ④ 저온단일처리

20. 꽃눈 분화 전후 저온에 의해서 생기는 토마토의 기형과(畸形果)는?

- ① 부패과(腐敗果)
- ② 난형과(亂形果)
- ③ 곡과(曲果)
- ④ 공동과(空洞果)

【2과목】 시설원예학 (20문제)

21. 물 소비량을 계측하여 이를 기준으로 컴퓨터에 의해 관수간격과 관수량을 결정하는 방식은?

- ① feed back control 방식
- ② feed forward control 방식
- ③ manual control 방식
- ④ open-loop control 방식

22. 다음은 온실의 기화냉각법에 의한 냉방효율을 계산하는 식이다. ()안에 알맞은 것은?

$$\text{냉방효율} = \frac{\text{외기의 건구온도} - ()}{\text{외기의 건구온도} - \text{외기의 습구온도}} \times 100$$

- ① 유입기온
- ② 실내의 습구온도
- ③ 실내습도
- ④ 식물체온도

23. 동화산물의 전류에 가장 큰 영향을 미치는 환경요인은?

- ① 광
- ② 온도
- ③ 수분
- ④ 공기

24. 여러 가지 원예작물의 적정 탄산가스 농도 범위가 맞는 것은?

- ① 엽채류 500 - 1500ppm
- ② 근채류 1000 - 3000ppm
- ③ 과채류 1500 - 3000ppm
- ④ 화훼류 2000 - 3500ppm

25. 우리나라에서 시설원에 시작한 paper house로 1920년경 어떤 작목을 재배하였나?

- ① 배추
- ② 고추
- ③ 상치
- ④ 오이

26. 요수비율(증산계수)을 설명한 내용이다. 옳게 설명된 것은?

- ① 식물체 1g을 생산하는데 소요되는 생체중을 g으로 표시한다
- ② 식물체의 건물 1g을 생산하는데 소요되는 증산량(g)으로 표시한다
- ③ 식물 생체 1g을 생산하는데 소요되는 증산량(g)으로 표시한다
- ④ 식물 생체 1g을 생산하는데 소요되는 호흡량(g)으로 표시한다

27. 온실의 피복재면적 500m², 지표면적 200m², 환기창 면적 100m², 피복재 투과율 0.9일 때 온실의 보온비는?

- ① 0.2
- ② 0.23
- ③ 0.36
- ④ 0.4

28. 다음과 같은 조건으로 육묘했을 때 실육묘 주수는? (단, 트레이 규격 28 × 56cm (8 × 16공), 묘상면적 폭 140cm, 길이 56m, 육묘 효율 95% 이다.)

- ① 64,500주
- ② 62,300주
- ③ 60,800주
- ④ 60,000주

29. 양분흡수의 이론 중에서 이온흡수의 수동적 흡수와 관련이 없는 설은?

- ① 확산설
- ② 집단류설
- ③ 도난설(Donnan's theory)
- ④ 운반류설

30. 온실에 피복하는 저렴한 피복재로서 장기간 사용하기 위해서 많이 피복하는 경질 필름은?

- ① 폴리에스테르(PET)
- ② 초산비닐(EVA)
- ③ 유리섬유강화 아크릴(FRA)
- ④ 폴리에틸렌(PE)

31. 토마토의 생리장해 중 석회결핍에 의하여 발생하는 장해는?

- ① 난형과
- ② 열과
- ③ 배꼽썩음병
- ④ 공동과

32. 전기전도도(EC)에 대한 설명이 적절한 것은?

- ① 배양액내의 각성분의 함량을 전기적으로 나타낸 것
- ② 배양액내의 유기 이온 농도의 적산량을 나타낸 것
- ③ 배양액 내의 모든 이온농도에 따른 전극간의 전기 저항의 역수
- ④ 배양액 내의 각 성분의 종류에 따른 전극간의 전기저항의 역수

33. 온실설계시 설계풍속과 설계적설심에 대한 재현기간은 내용년수와 안전도로부터 산출한다. 재현기간이 가장 큰 것은?

- ① 내용년수 10년, 안전도 50%
- ② 내용년수 15년, 안전도 50%
- ③ 내용년수 15년, 안전도 70%
- ④ 내용년수 20년, 안전도 70%

34. 태양고도가 낮은 지역에서 많이 사용될 수 있는 온실형태를 짚지은 것은?

- ① 양지붕형 온실, 외지붕형 온실
- ② 벤로형 온실, 연동형 온실
- ③ 3/4형 온실, 외지붕형 온실
- ④ 연동형 온실, 양지붕형 온실

35. 양액재배는 순수수경과 고행배지경으로 구분한다. 고행배지경에 속하는 것?

- ① 분무수경
- ② 박막수경
- ③ 담액수경
- ④ 폴리우레탄경

36. 다음 중 광합성에 가장 유효하고 광주기성에도 유효한 광선의 파장영역은?

- ① 1,000 ~ 700nm
- ② 700 ~ 610nm
- ③ 610 ~ 510nm
- ④ 315 ~ 280nm

37. 온실 외피복자재 중 열전도율이 낮고 충격에 강하고 굽힘강도가 높으면서 산란성이 높고 자외선 투과율이 낮은 자재는?

- ① FRP 판
- ② FRA 판
- ③ MMA 판
- ④ PET

38. 식물공장의 특징으로 가장 옳은 것은?

- ① 연작장해가 심하다.
- ② 단위면적당 생산량이 떨어진다.
- ③ 외부기상조건의 영향을 많이 받는다.
- ④ 생육속도가 빨라 재배기간이 단축된다.

39. 딸기에서 나타나는 기형과 발생률을 줄일 수 있는 가장 효과적인 방법은?

- ① 꿀벌방사
- ② GA 처리
- ③ 엽면적 증대
- ④ 적엽, 적과

40. 병에 감염되지 않은 식물에 생육상 영향을 끼치지 않을 정도로 약한 병원균을 접종시켜 그 병의 감염을 방지하게 된다. 그 방제법은?

- ① 저항성품종 육성법
- ② 접목법
- ③ 바이러스 무병주 이용법
- ④ 약독 바이러스 이용법

【3과목】 재배학원론 (20문제)

41. 강광조건을 요구하는 토마토가 저광조건에서 나타나지 않는 현상은?

- ① 건물중 감소
- ② 잎이 커지고 엽육이 얇아짐
- ③ 초장이 길어짐
- ④ 착과율 증가

42. 풍속과 동압(動壓)과의 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① 동압은 풍속의 제곱에 비례한다.
- ② 동압은 풍속에 비례한다.
- ③ 동압은 풍속의 제곱에 반비례한다.
- ④ 동압은 풍속에 반비례한다.

43. 시설내의 지하부 환경 계측에 속하는 것은?

- ① 공기
- ② 일사량
- ③ 풍속
- ④ 지온

44. 미포화 습공기를 냉각하면 어떤 온도에서 포화상태가 된다. 이때의 온도를 무슨 온도라 하는가?

- ① 건구온도
- ② 습구온도
- ③ 절대온도
- ④ 노점온도

45. 식물 엽의 광합성속도를 측정하는 방법이 아닌 것은?

- ① CO₂의 방출 또는 O₂의 흡수속도를 측정하는 방법
- ② CO₂의 흡수속도를 측정하는 방법
- ③ O₂의 방출속도를 측정하는 방법
- ④ 건물생산이나 탄수화물의 생산속도를 측정하는 방법

46. 온실 작물 생산을 위한 토양환경 중 염류집적 방지대책으로 가장 적합한 것은?

- ① 다량의 관수에 의한 염류용탈
- ② 온실 밀폐 건조 조건 유지
- ③ 기비 위주의 재배 관리
- ④ 다비 재배방법 도입

47. 시설원예의 환경조절을 위한 기본적인 과정이 아닌 것은?

- ① 환경 조건과 작물 반응에 대한 정량화
- ② 시설내의 환경 형성의 메카니즘 해석
- ③ 환경 조절에 의한 작물 반응의 제어
- ④ 복합 환경제어시스템의 체계적 구축

48. 식물체내의 수분 퍼텐셜을 측정하는 사이크로 미터법은 무엇을 측정하여 수분퍼텐셜을 산정하는가?

- ① 상대습도
- ② 절대습도
- ③ 온도
- ④ 압력

49. 다음 중 온도계의 종류와 측정원리가 다른 것은?

- ① 유리봉상온도계 - 수은, 알코올 등의 체팽창
- ② 바이메탈온도계 - 서로 다른 두 금속의 온도 팽창변위
- ③ 열전대 온도계 - 서로 다른 두 금속선의 접촉에 의한 금속 팽창 변위
- ④ 저항온도계 - 금속과 반도체에 대한 전기저항의 온도의존성

50. 시설내 탄산가스 조절 방법으로 가격이 비싸고 농도조절이 가장 어려운 것은?

- ① 액체탄산 이용
- ② 고체탄산 이용
- ③ 유기물 연소법
- ④ 탄산가스 발생제

51. 시설내의 온도관리의 방법 중에서 동화산물의 전류를 촉진시키기 위해서 야간에 변온관리를 하는데 다음 중에 적절한 것은 어느 것인가?

- ① 일몰후 1~2시간은 약간 고온을 유지한다.
- ② 일몰후 4~5시간은 약간 고온을 유지한다.
- ③ 일출전 6~8시간은 약간 고온을 유지한다.
- ④ 자정후 2~3시간은 약간 고온을 유지한다.

52. 적외선 탄산가스 측정 방법에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 적외 파장역의 고유한 흡수 스펙트럼을 이용한다.
- ② 습도가 높을 경우는 계측 정도가 감소한다.
- ③ 온도의 변화에 따라서 계측 정도가 변한다.
- ④ 적외선 흡수에 의한 광강도의 감쇠 현상을 이용한다.

53. 인공광 이용형 식물공장 도입을 위해 선결되어야 할 최우선 과제는 무엇인가?

- ① 주년 연속생산 기술과 계획생산 및 생산량 조절 기술이 확립되어야 한다.
- ② 컴퓨터에 의한 재배 환경관리의 완벽한 자동화기술이 확립되어야 한다.
- ③ 자연광에 가까운 저비용 고효율 인공광이 개발되어야 한다.
- ④ 재배 생력화를 위한 입체 또는 이동식 재배 시스템 등의 로봇이 개발되어야 한다.

54. 많은 센서에서 계측된 환경계측데이터를 컴퓨터에서 읽을 수 있도록 변환시키는 방법은?

- ① 센서 - A/D 변환기 - 멀티플렉서 - 컴퓨터
- ② 센서 - D/A 변환기 - 멀티플렉서 - 컴퓨터
- ③ 센서 - 멀티플렉서 - A/D 변환기 - 컴퓨터
- ④ 센서 - 멀티플렉서 - D/A 변환기 - 컴퓨터

55. 작물의 가장 효율적인 신장 억제를 실시할 수 있는 방법은?

- ① 일출 직후 2~3시간 동안의 저온처리
- ② 야간 2시간 동안의 고온처리
- ③ 일몰 후 2시간 동안의 저온처리
- ④ 일몰 전 2시간 동안의 저온처리

56. 화상계측에 의한 비파괴적인 방법으로 식물체온과 엽온의 계측이 가능해짐에 따라 작물의 생리 생태학적인 측면에서 큰 발전이 이루어지고 있다. 그 활동 분야는?

- ① 작물엽내 전분 함량 계측
- ② 작물생체의 수분생리와 광합성 측정
- ③ 작물생체 내 무기양분의 이동과 흡수량 측정
- ④ 원예작물의 생장해석에 활용

57. 산도(pH)를 측정하는 방법으로 적당한 것은?

- ① 유리전극법
- ② 광간섭법
- ③ 암막법
- ④ 전기저항법

58. 열전도식 탄산가스 분석기에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 광범위한 탄산가스 농도를 측정할 수 있다.
- ② 센서의 안정성, 내구성이 떨어진다.
- ③ 농업용으로 많이 사용되며 저농도 측정에 적합하다.
- ④ 주변 온·습도의 영향을 받지 않는다.



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

59. 장미 아칭재배의 장점이 아닌 것은?


- ① 연작 피해를 줄일 수 있다.
- ② 삽목묘 이용이 가능하다.
- ③ 작업이 간단하여 재배규모의 확대가 가능하다.
- ④ 장치형 재배로 초기 투자비가 많이 든다.

60. 광합성 유효광량 자속 발광 효율이 가장 높은 광원은?

- ① 백열전구
- ② 형광등
- ③ 메탈할라이드 램프
- ④ 저압나트륨 램프

【4과목】 작물생리학 (20문제)

61. 포도당이 완전히 산화된다면 그로부터 발생될 수 있는 에너지의 이론값은?



- ① 386 kcal
- ② 486 kcal
- ③ 586 kcal
- ④ 686 kcal

62. 다음 중 작물종자의 휴면을 일으키는 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 발아억제물질의 존재
- ② 씨눈(胚)의 미성숙(未成熟)
- ③ 지베렐린, 옥옥신 그리고 에틸렌의 다량 함유
- ④ 수분과 산소에 대한 종피의 불투과성

63. 다음 중 단일식물에 속하는 작물로 짝지은 것은?

- ① 시금치, 봄밀
- ② 담배, 국화
- ③ 감자, 사탕무
- ④ 가을보리, 귀리

64. 다음은 식물 세포내의 리보솜(ribosome)에 관하여 설명한 것이다. 틀리게 표현된 것은?

- ① RNA를 많이 함유하고 있다.
- ② 세포질 속에 있으므로 핵내의 DNA와는 관련이 없다.
- ③ 세포질 속의 원형질막 부근에 둥근 입자로서 분포되어 있다.
- ④ 식물 세포 내에서 단백질 합성의 역할을 한다.

65. 작물 잎의 수분함량이 1일을 기준으로 하였을 때 가장 높은 시간은?

- ① 6시
- ② 12시
- ③ 18시
- ④ 24시

66. 수분·수정 후에 발달하여 종자가 되는 기관은 어느 것인가?

- ① 배주
- ② 자방
- ③ 주두
- ④ 화분관

67. 체관부(篩部)를 통하여 가장 많이 전류 되는 광합성 산물은?

- ① 과당(Fructose)
- ② 포도당(Glucose)
- ③ 자당(Sucrose)
- ④ 라피노오스(Raffinose)

68. 작물의 불임성에 관한 원인으로 맞지 않는 것은?

- ① 수정 후 퇴화로 인한 불임성
- ② 교배 친화성
- ③ 자·웅성기관의 결함
- ④ 자가불화합성

69. 영양생장과 생식생장을 병행하는 것으로 짝지은 것은?

- ① 벼, 보리, 밀
- ② 콩, 오이, 호박
- ③ 무, 배추, 당근
- ④ 감자, 마, 고구마

70. 다음중 식물생장 조절물질로만 짝지워진 것은 어느 것인가?

- ① GA, 2,4-D, IAA, BA
- ② GA, MCP, PCP, NIP(TOK)
- ③ Kinin, GA, NAA, CNP(MO)
- ④ 2,4-D, MH, DCPA(Stam-F), PCP

71. 다음의 무기양분 중 그 결핍 증상이 공통적으로 잎에 황화현상(Chlorosis)이 생기는 것은?

- ① P, K, S, Zn
- ② N, Mg, Fe, Mn
- ③ C, H, Mo, Si
- ④ Al, Ca, Na, B

72. 세포 기질(기초질)계의 명칭과 특징을 알맞게 나타낸 것은?

- ① 시토졸(cytosol)이라고도 부르며 투명질이다.
- ② 완전한 콜로이드계를 이루고 있다.
- ③ 주로 졸(sol)상태로 존재하며 겔(gel) 상태로 존재하지 않는다.
- ④ 기초 대사에 관여하는 주요 효소는 존재하지 않는다.

73. 식물체의 구성성분들의 총 중량비(%)로 가장 높은 것은?

- ① N, P, K
- ② Fe, Mn, S
- ③ K, C, N
- ④ C, H, O

74. 일액현상(溢液現象)에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 일액(溢液)은 용해된 염(鹽)이나 당분을 함유한다.
- ② 주로 밤에 일어난다.
- ③ 기공을 통해서만 배출된다.
- ④ 기공의 활동에 의하여 조절되는 현상은 아니다.

75. 다음 중에서 팽압의 역할이 아닌 것은?

- ① 광합성(photosynthesis)
- ② 세포비대(cell enlargement)
- ③ 식물체 골격유지(plant structure)
- ④ 엽형유지(foliar display)

76. 다음 중 원형질막의 투과성에 관하여 옳지 않게 기술된 것은?

- ① 선택성 투과성을 지니고 있다.
- ② 전해질의 원형질막 투과는 수동적 흡수의 영향을 지배적으로 받는다.
- ③ 비전해질의 용질 투과는 원형질막의 지질(脂質)에 대한 용해도와 관계 있다.
- ④ 수동적인 전해질 흡수는 대체로 호흡과는 관계없이 진행된다.

77. 꽃양배추(cauliflower)와 녹색꽃양배추(broccoli)는 식물체의 어떤 기관을 식용으로 이용하는가?

- ① 잎
- ② 줄기
- ③ 꽃봉오리
- ④ 뿌리

78. 종자의 발아 촉진법이 아닌 것은?

- ① 침종 처리
- ② 저온 처리
- ③ 적색광 처리
- ④ 오옥신 처리

79. 녹색식물의 광합성 결과로 방출되는 O₂는 다음 중 어떤 것인가?

- ① 흡수한 CO₂에서 분리된 것이다.
- ② 흡수한 H₂O 에서 분리된 것이다.
- ③ 동화물질의 환원으로 분리된 것이다.
- ④ 흡수한 CO₂와 H₂O 에서 분리된 것이다.

80. 종자의 발아력을 오래 유지시킬 수 있는 저장조건이 되지 못하는 것은?

- ① 온도는 가급적 낮게
- ② 종자의 함수율을 낮게
- ③ 산소는 낮고 탄산가스는 높게
- ④ 산소는 높고 탄산가스는 낮게

【5과목】 수경재배학 (20문제)

81. 비료의 사용에 의한 산성화의 영향이 가장 적은 비료는?

- ① 석회의 사용
- ② 염화암모늄의 사용
- ③ 황산암모늄의 사용
- ④ 요소의 사용

82. 토양의 유기물함량이 같고 점토 광물의 종류가 같을 때 pH 완충능이 가장 큰 토양은?

- ① 사양토
- ② 식토
- ③ 양토
- ④ 사력질토

83. 석회질비료는 대부분 토양의 물리·화학적 성질을 개선하는데 사용되고 있는데, 석회질비료의 주성분인 알칼리분이 가장 많은 비료는?

- ① 석회고토
- ② 소석회
- ③ 석회석
- ④ 생석회

84. 질소 결핍 시 나타나는 증상이 아닌 것은?

- ① amine 합성
- ② 잎의 황백화 현상
- ③ 식물의 성숙시기가 빨라짐
- ④ 전체 생육상태가 부진

85. 가비중이 1.33 인 토양의 공극이 50% 만 물로 채워져 있다면 토양의 수분함량은 몇 % (V/V)인가? (단, 토양의 진비중은 2.66 이다.)

- ① 13.3%
- ② 25.0%
- ③ 50.0%
- ④ 66.5%

86. 토양의 비열(specific heat)에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 비열이란 토양 1g을 1분 동안 1℃ 높이는데 필요한 열량이다.
- ② 토양 중 액상의 비가 증가할수록 용적비열이 작다.
- ③ 공극률이 증가할수록 용적비열이 크다.
- ④ 고상 중 무기성분의 비열이 유기성분의 비열보다 작다.

87. 암석의 화학적 풍화작용 중 다음 설명에 해당하는 것은?

- 무수물이 합수물로 되는 작용
- 암석의 풍화과정 중 이 작용이 일어나면 이로 인하여 팽창이 발생하여 물리적 풍화를 조장
- 대표적인 예는 적철광이 갈철광으로 변하는 것

- ① 가수분해(hydrolysis)
- ② 산화작용(oxidation)
- ③ 수화작용(hydration)
- ④ 탄산화작용(carbonation)

88. 식물체를 구성하고 있는 유기물질 중 일반적으로 생물학적 분해에 대한 저항성이 가장 강한 성분은?

- ① 리그닌
- ② 글루코오스
- ③ 셀룰로오스
- ④ 헤미셀룰로오스

89. 비료를 사용할 때 토양산성화와 관계가 없는 것은?

- ① 황산칼륨
- ② 요소
- ③ 염화칼륨
- ④ 황산암모늄

90. 식물이 이용할 수 없는 질소화합물의 형태는?

- ① NH_4^+
- ② NO_3^-
- ③ N_2O
- ④ NH_2

91. 국제토양학회법에 의한 토양입자의 입경분류기준에서 자갈의 입경은?

- ① 2mm 이상
- ② 5mm 이상
- ③ 10mm 이상
- ④ 25mm 이상

92. 10a의 재배 시험포에 23kg의 질소를 주려고 할 때 필요한 요소의 양은?

- ① 약 30kg
- ② 약 40kg
- ③ 약 50kg
- ④ 약 60kg

93. 황산암모늄과 요소비료의 화학식이 바르게 나열된 것은?

- ① NH_4NO_3 , $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$
- ② NH_4NO_3 , $\text{CO}(\text{CH}_2)_2$
- ③ $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, NH_4Cl
- ④ $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$

94. 토양의 유기물 정량을 위한 토양 분석법은?

- ① 염광광도 계법
- ② Lancaster 법
- ③ Tyurin 법
- ④ EDTA 적정법

95. 다음 중 산성 토양에서 저항력이 가장 강한 작물은?

- ① 보리, 시금치
- ② 벼, 귀리
- ③ 양배추, 오이
- ④ 당근, 파

96. 다음 중 "인산을 특히 필요로 하는 작물은 옥수수, 사탕수수이다" 라고 할 때 적용되는 식물생산에 대한 법칙에 해당하는 것은?

- ① 과잉흡수의 법칙
- ② 우세의 법칙
- ③ Wolf의 법칙
- ④ 최소양분율

97. 토양단면이 잘 발달되지 않은 비교적 새로운 토양목(soil order)을 의미하는 것은?

- ① Entisols
- ② Vertisol
- ③ Aridisols
- ④ Spodosols

98. RuBP carboxylase의 활성화 작용에 가장 중요한 역할을 하는 원소는?

- ① B
- ② Mg
- ③ Mn
- ④ Fe

99. 토양을 사용하여 실제와 똑같은 조건으로 시험하는 토경법(Soil culture)에 해당되지 않는 것은?

- ① Pot 시험
- ② 정밀 시험
- ③ 삼투 시험
- ④ Knop 시험

100. 식물 생육에서 에너지대사와 가장 밀접한 관계가 있는 성분은?

- ① 칼륨
- ② 황
- ③ 마그네슘
- ④ 인산