

1과목 : 조림학

1. 다음 수종 중 토양의 수분요구도가 가장 높은 수종은?

- ① 잣나무                      ② 낙엽송(일본잎갈나무)
- ③ 삼나무                      ④ 소나무

2. 건생식물의 일반적인 형태적 특성으로 틀린 것은?

- ① 각피층이 얇다.
- ② 잎의 크기가 작거나, 경엽을 가지고 있다.
- ③ 세포간극이 축소된다.
- ④ 표면에 왁스층이 잘 발달되어 있다.

3. 우리나라 조림 수종 중 도입 수종은?

- ① 잎갈나무                      ② 잣나무
- ③ 소나무                      ④ 사방오리나무

4. 밀짚기 작업은 보통 어느 시기에 실시하는가?

- ① 12 ~ 1월 중                      ② 3 ~ 4월 중
- ③ 6 ~ 8월 중                      ④ 9 ~ 10월 중

5. 잣나무를 폭 2m, 열 2m 간격으로 5ha를 정방형 조림하고자 할 때 필요한 묘목 본수는?

- ① 7500본                      ② 10000본
- ③ 12500본                      ④ 15000본

6. 산림토양이 산성화됨에 따라 나타나는 현상에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수소이온이 뿌리에 흡수되어 단백질이 응고되거나, 효소의 작용을 방해한다.
- ② 토양용액 중에 활성 알루미늄의 농도가 높아져 묘목 생장에 장애가 된다.
- ③ 토양에서 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등의 양이온이 용탈된다.
- ④ 토양의 입단구조가 발달하여 토양미생물의 생육에 유리하게 된다.

7. 발아시험에서 일정 기간내의 발아립수를 시험에 사용한 전체립수에 대한 백분율로 나타낸 것은?

- ① 순량률                      ② 발아력
- ③ 효율                      ④ 용적중

8. 제벌작업을 가장 정확하게 설명한 것은?

- ① 목적 이외의 수종이나 형질이 불량한 임목을 제거하는 것이다.
- ② 조림 후 임목이 성장하여 밀식된 임목을 벌채하는 것이다.
- ③ 조림 후 병해충의 피해를 받은 임목만 벌채하는 것이다.
- ④ 맹아력이 강한 수종만을 골라 벌채하는 것이다.

9. 갱신의 방법에서 인공조림에 의한 방법이 아닌 것은?

- ① 파종 조림                      ② 식수 조림
- ③ 삼목 조림                      ④ 맹아 갱신

10. 큰 수종을 이식할 때 뿌리돌림을 해서 근주 부근에 세균을 발달시키고 뒤에 근분을 떠서 활착을 돕고자 할 때 수종과 뿌리돌림의 시기가 적합하게 짝지어진 것은?

- ① 낙엽수종 : 11 ~ 2월 상순, 혹은 2 ~ 3월 상순
- ② 상록 침엽수종 : 7 ~ 8월 상순
- ③ 상록 활엽수종 : 한겨울
- ④ 수종마다 큰 차이가 없고 년 중 어느 때든지 적합하다.

11. 임지의 잠재생산능력 급수가 V급인 곳에 조림해야 할 수종은?

- ① 오리나무                      ② 낙엽송
- ③ 공솔                      ④ 현사시나무

12. 생가지치기를 하여도 상구 부후의 위험성이 거의 없는 수종으로 짝지어진 것은?

- ① 자작나무류, 단풍나무류                      ② 삼나무, 물푸레나무
- ③ 벚나무류, 느릅나무류                      ④ 편백, 포플러류

13. 묘 포지를 경운(발갈이)작업할 때 나타나는 효과로 맞는 것은?

- ① 토양내 산소량이 감소한다.
- ② 토양의 보수력을 감소시킨다.
- ③ 토양의 풍화작용을 촉진시킨다.
- ④ 토양내 탄산가스량은 영향이 없다.

14. 1년생 묘목을 상채하는데 적합하지 않는 수종은?

- ① 편백                      ② 삼나무
- ③ 소나무류                      ④ 참나무류

15. 우리나라 한 대림에서 관찰할 수 없는 수종은?

- ① 가문비나무                      ② 주목
- ③ 단풍나무                      ④ 잣나무

16. 관다발 형성층의 시원세포가 수피 방향으로 분열하여 형성되며, 사부유 조직, 사부섬유, 반세포 등의 복합조직으로 구성되는 것은?

- ① 체관부                      ② 물관부
- ③ 수피층                      ④ 측아

17. 순림에 관한 특징 설명으로 옳은 것은?

- ① 숲의 구성이 단조로워서 병충해, 풍해의 저항력이 강하다.
- ② 침엽수만으로 형성된 순림에서는 임지의 악화가 초래되는 일이 없다.
- ③ 경제적으로 가치있는 나무를 대량 생산할 수 있다.
- ④ 임지를 완전하게 이용할 수 있다.

18. 종자의 생리적 휴면을 유지시키는 호르몬은?

- ① 옥신(auxin)                      ② 지베렐린(gibberellin)
- ③ 사이토키닌(cytokinin)                      ④ 아브시스산(abscisic acid)

19. 개화한 해에는 종실이 거의 자라지 않고, 다음해 가을에 빨리 자라서 성숙하는 나무는?

- ① 떡갈나무                      ② 상수리나무
- ③ 신갈나무                      ④ 졸참나무

20. 총광합성량을 A, 호흡량을 R, 물질 순생산량을 N 이라고 할 때, 이들 간의 관계식을 바르게 나타낸 것은?


- ① A + R = N                      ② A + N = R

- ③  $R \times A = N$       ①  $A - R = N$

2과목 : 임목육종학

21. 두 종의 A, B우성 유전자가 하나의 형질에 관여할 경우 이것을 중복유전자라고 하는데,  $F_1(AaBb)$ 의  $F_2$ 에 있어서의 우성대 열성의 분리비는?  
 ① 9:7                      ② 15:1  
 ③ 1:3:1                    ④ 9:6:1
22. 다음 중 잡종강세를 이용하여 품종을 육성하기 가장 용이한 수종은?  
 ① 포플러류                ② 아까시나무  
 ③ 싸리나무                ④ 상수리나무
23. 돌연변이를 유발시키는데 고티친 수용액을 사용하는데 일반적으로 수목의 육종에 사용하는 농도의 범위로 가장 적합한 것은?  
 ① 0.1 ~ 0.5%            ② 1 ~ 5%  
 ③ 10 ~ 50%              ④ 50% 이상
24. 일반적으로 4배체와 2배체의 화분의 발아속도는?  
 ① 같다.                    ② 일정하지 않다.  
 ③ 2배체 화분이 더 빠르다.   ④ 4배체 화분이 더 빠르다.
25. AA개체와 aa개체를 교잡하여  $F_1$ 에서 Aa의 개체를 얻었다. 다음 중 검정교잡은?  
 ①  $AA \times Aa$                 ②  $Aa \times AA$   
 ③  $Aa \times aa$                 ④  $AA \times aa$
26. 인공수분의 과정에서 수분봉지를 씌어주는 일반적인 시기는?  
 ① 수분작업 3 ~ 4주일 전   ② 수분작업 1 ~ 2주일 전  
 ③ 수분작업 하루 전        ④ 수분작업 2 ~ 3일 후
27. 외국수종의 도입에 앞서 고려되어야 할 사항 중에서 중요도가 가장 낮은 것은?  
 ① 자연분포지에서의 성장과 성질  
 ② 자연분포지에서의 유전적 변이  
 ③ 자연분포지와 도입지와의 기후의 유사성  
 ④ 자연분포지의 크기
28. 교잡친화성을 향상시키는 방법이 아닌 것은?  
 ① 중개화분                ② 식별화분  
 ③ 용제처리                ④ 생장조절물질처리
29. 유전 획득량, 선발차 그리고 유전력의 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 유전력이 클수록 선발차도 커진다.  
 ② 선발차가 클수록 유전 획득량은 적어진다.  
 ③ 선발차는 유전 획득량과 관계가 없다.  
 ④ 유전력이 클수록 유전 획득량도 커진다.
30. 인공교배시 제웅작업이 필요없는 수종은?  
 ① *Pinus densiflora*        ② *Hibiscus syriacus*  
 ③ *Ginkgo biloba*            ④ *Pinus koraiensis*

31. 다음 그림과 같이 교배가 일어났을 때 A와 B간의 근연계수는 얼마인가?



- ① 1                              ② 1/2
  - ③ 1/4                            ④ 1/8
32. 다음 중에서 유전력을 구할 수 없는 경우는?  
 ① 유전자의 상가적 및 우성효과에 의한 분산을 알 때  
 ② 양친,  $F_1$  및  $F_2$ 세대의 분산을 알 때  
 ③ 양친에 대한 자식의 회귀를 알 때  
 ④ 선발실험에서 선발차와 유전획득량을 알 때
33. 대립유전자 A와 a에 있어서 A는 a에 대하여 완전우성이라 할 때  $Aa \times Aa$ 에서 생겨나는  $F_1$ 세대의 표현형의 수는?  
 ① 1                              ② 2  
 ③ 3                              ④ 4
34. 다음 중 침엽수의 세대축진법으로 가장 적합한 것은?  
 ① 삼목                        ② 점목  
 ③ 발아축진                  ④ 인공교배
35. 다음 그림과 같은 경사지에 차대검정림의 반복구(block 또는 replication)와 시험구를 배치하고자 한다. 다음 중 가장 이상적인 배치 방법은?  
  - ① 반복구는 등고선과 평행, 시험구는 등고선과 수직
  - ② 반복구와 시험구가 모두 등고선과 평행
  - ③ 반복구와 시험구가 모두 등고선과 수직
  - ④ 반복구는 등고선과 수직, 시험구는 등고선과 평행
36. 소나무의 형질 중 가장 유전력이 높은 것은?  
 ① 수고                        ② 직경  
 ③ 수간의 통직성            ④ 뿌리길이
37. 다음 중 양친과 후대간의 유전상관이 가장 높은 경우는?  
 ① 산지시험목                ② 집단선발 차대검정목  
 ③ 반형매 차대검정목      ④ 정형매 차대검정목
38. 외국에서 품종을 도입할 때 식물검역이 가장 중요한 이유는?



59. 수목의 경제적인 피해를 초래하는 해충의 최고밀도를 나타내는 경제적 가해 수준이 가장 낮은 해충은?

- ① 측백나무하늘소      ② 흰불나방
- ③ 솔잎혹파리          ④ 밤바구미

60. 다음 야생동물 중 식충목에 해당하는 것은?

- ① 곰                      ② 멧돼지
- ③ 사슴                   ④ 두더지

4과목 : 토양학 및 비료학

61. 다음 중 형태론적 토양분류에서 분류의 가장 고차 단위는?

- ① 통(統, series)        ② 목(目, order)
- ③ 과(科, family)       ④ 대군(大群, great group)

62. 양이온 치환용량이 15cmol/kg(15me/100g)인 토양 입자 표면에 흡착되어 있는  $Al^{+3}$ ,  $Ca^{+2}$ ,  $Mg^{+2}$ ,  $K^+$ ,  $Na^+$ 의 양이 각각 2, 2, 3, 4, 1cmol/kg라면 이 토양의 염기포화도(base saturation)는 dir 얼마인가?

- ① 33%                    ② 50%
- ③ 68%                    ④ 80%

63. 다음 식물의 영양성분 중 토양반응이 중성 이상으로 될 때 유효도가 증가하는 것은?

- ① Fe                      ② Mn
- ③ Cu                      ④ Mo

64. 다음 중 토양의 형태적 성질과 발달 정도를 가장 쉽게 판단할 수 있는 것은?

- ① 지형                    ② 토성
- ③ 토양 단면              ④ 지질 및 모암

65. 토양수분이 점차 감소하여 식물이 시들기 시작하여 회복되지 않는 위조점에서의 흡착력은 약 몇MPa 인가?

- ① 1.0                      ② 1.5
- ③ 2.7                      ④ 4.2

66. 토양의 모세관수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내부 모세관수는 주로 교질 미셀의 삼투압으로 유지되며 식물에는 거의 이용되지 않는다.
- ② 외부 모세관수는 주로 표면장력이나 중력에 견뎌서 유지되며 식물에 주로 이용된다.
- ③ 입자가 미세한 토양일수록 모세관 수량이 많아진다.
- ④ 모세관력에 의한 물의 상승은 일반적으로 모세관의 반지름에 비례한다.

67. 다음 토양목 중 건조지방의 토양을 나타내는 것은?

- ① Entisol                ② Inceptisol
- ③ Aridisol                ④ Spodosol

68. 토양 유기물 부식의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 온도 하강 효과가 있다.
- ② 양분 저장능력이 저하된다.
- ③ 유용한 화학반응을 촉진시킨다.
- ④ 중금속이온의 유해작용을 증가시킨다.

69. 퇴비 중의 탄소와 질소의 함량이 각각 20% 와 1% 라고 할 때 이 퇴비의 탄질율은?

- ① 10 : 1                    ② 15 : 1
- ③ 20 : 1                    ④ 30 : 1

70. 토양의 밀도와 공극량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공극량은 식토가 사토보다 크다.
- ② 용적밀도는 사토가 식토보다 크다.
- ③ 용적밀도가 증가하면 공극량은 감소한다.
- ④ 공극량이 증가하면 입자밀도는 감소한다.

71. 다음 중 규소가 가장 필요한 작물은?

- ① 벼                        ② 대두
- ③ 고추                      ④ 감자

72. 식물체 내에서 이동이 어려워 결핍되면 담배의 끝마름병 등을 유발시키는 미량원소는?

- ① B                        ② Cu
- ③ Zn                       ④ Fe

73. 다음 중 식물이 주로 흡수하는 망간의 형태는?

- ①  $MnO_4^-$                 ②  $Mn^{2+}$
- ③  $MnO_4^{2-}$               ④  $Mn^{3+}$

74. 중과린산석회 1포(25kg)의 구입가격이 1820원이라면 유효인산 kg 당 단가(성분단가)는 약 얼마인가? (단, 중과린산석회의 유효인산 함유량은 45%이다.)

- ① 73원                    ② 146원
- ③ 162원                   ④ 193원

75. 다음 중 비료를 배합함에 있어 가장 유리한 경우는?

- ① 질산석회와 신선퇴비의 혼합
- ② 어비류 및 깻묵류와 회류의 혼합
- ③ 과석 및 중과석과 석회질비료의 혼합
- ④ 황산암모늄 및 인분뇨와 석회질비료의 혼합

76. 다음 중 미생물에 의한 질소고정 능력이 가장 큰 작물은?

- ① 헤어리베치            ② 레드클로버
- ③ 콩                        ④ 알팔파

77. 논 1ha 당 질소(N) 100kg을 요하는 경우에 황산암모늄의 실제 시비량은 약 몇 kg 인가? (단, 퇴비는 10ton을 주고 부족한 질소는 황산암모늄을 이용한다. 퇴비와 황산암모늄 중의 질소(N) 함유량은 각각 0.6%, 20.8% 이다. 벼의 퇴비 이용율은 30% 이고, 황산암모늄의 이용률은 64% 이다.)

- ① 18                        ② 128
- ③ 323                      ④ 616

78. 토양에 처음부터 존재하던 양분이나 비료로 준 성분이 아래 층으로 이동하는 현상(용탈)을 시험하는 방법은?

- ① 수경법                    ② 동위원소 이용법
- ③ 라이시미터 시험       ④ 자동라디오그래피법

79. 비료의 3요소 시험에 의한 수량조사 결과, 무질소구 및 무인산구의 수량이 무비료구와 비슷하였고 무칼리구의 수량이 완전구와 큰 차이가 없다면 다음 중 이 때의 판단으로 가장

적당한 것은?

- ① 인산이 풍부한 토양이다.
- ② 질소가 풍부한 토양이다.
- ③ 칼 리가 결핍된 토양이다.
- ④ 질소, 인산이 결핍된 토양이다.

80. 식물 생산에 관한 법칙 중 우세의 원리에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 콩과식물, 포도, 감자 등은 비료성분 중 특히 칼리를 다량으로 필요로 한다.
- ② 작물은 많이 존재하는 성분이 있으면 생리적으로 필요 이상의 양을 흡수하는 성질이 있다.
- ③ 식물의 생산량은 가장 부족되는 무기성분량에 의하여 지배된다.
- ④ 품종이 나쁠 때는 재배법이나 시비법을 아무리 개량하여도 어느 정도 이상의 수량은 얻지 못한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	④	③	③	④	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	③	①	③	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	①	③	③	②	④	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	②	①	③	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	②	④	①	②	③	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	④	③	②	③	④	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	③	②	④	③	③	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	②	③	②	④	④	③	④	①