


1과목 : 가축육종학

1. R의 가계도가 다음과 같을 때 R의 근교계수는? (단, $F_A=0$)



- ① 0.10 ② 0.25
 - ③ 0.50 ④ 0.75
2. 어느 수소를 검정하였다더니 일당 증체량이 1300g 이었다. 한 우의 일당 증체량 평균이 900g이고 일당 증체량의 유전력이 0.40이라면 이 소의 육종가는?
- ① 160g ② 360g
 - ③ 1060g ④ 1460g
3. 생물에 대한 인위적인 돌연변이 유발원 물질들은 비교적 많은 편이다. 실용성이 가장 떨어지는 물질은?
- ① 자외선 ② 초음파
 - ③ proton ④ colchicine
4. 유전력 추정치가 높은 수치로 나타날 수 있는 조건이 아닌 것은?
- ① 환경변이의 최소화 ② 유전변이의 극대화
 - ③ 상가적 분산의 최대화 ④ 환경변이의 최대화
5. hen-day rate of egg production을 옳게 설명한 것은?
- ① 일정기간의 총산란수를 기간 내 매일 생존 암탉수로 나눈 것
 - ② 일정기간의 총산란수를 그 기간 최초의 암탉수로 나눈 것
 - ③ 일정기간의 총산란수를 마지막 날의 생존 암탉수로 나눈 것
 - ④ 일정기간의 총산란수를 기간 중간날의 생존 암탉수로 나눈 것
6. 육용계(재래닭 제외)의 경제형질과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 성장률 ② 사료효율
 - ③ 도체율 ④ 8주 체중
7. 1000마리의 앵거스(Angus)소에 대한 모색을 조사한 결과가 아래와 같을 때 붉은색에 대한 유전자 빈도는 얼마인가? (단, 유전적 평형상태를 가정한다.)
- | 표현형 | 유전자형 | 두수 |
|-----|----------|-----|
| 검은색 | BB 혹은 Bb | 640 |
| 붉은색 | bb | 360 |
- ① 0.4 ② 0.6
 - ③ 0.8 ④ 1.0
8. 서로 다른 유전자좌위에 있는 비대립 유전자간의 상호작용에 따른 유전현상에 해당하는 것은?
- ① 완전우성 ② 상위유전자작용
 - ③ 공우성 ④ 복대립유전자작용

9. 돼지의 경제형질에 해당하지 않는 것은?
- ① 복당 산자수(litter size)
 - ② 이유시 체중(weaning weight)
 - ③ 이유 후 성장률(post-weaning growth rate)
 - ④ 유량(milk yield)
10. 폐쇄된 집단내에서 선발을 실시할 때 근교계수의 상승을 낮게 하는데 가장 효과적인 선발방법은?
- ① 후대검정 ② 가계선발
 - ③ 가계내선발 ④ 상반반복선발
11. 젖소에서 많이 이용되는 교배 방법은?
- ① 근친교배 ② 이계교배
 - ③ 계통교배 ④ 잡종교배
12. 변이의 크기를 나타내는 방법이 아닌 것은?
- ① 평균 ② 분산
 - ③ 범위 ④ 표준편차
13. 소의 이성쌍태(異性雙胎)에 있어서 암컷에 나타나는 이상(異商)으로 이를 프리마틴(Freemartin) 이라고 하는데 성의 형태는 어떤 것인가?
- ① 자성(雌性) ② 웅성(雄性)
 - ③ 간성(間性) ④ 우성(優性)
14. 돼지에 있어서 백색인 요크셔(Yorkshire)종과 흑색인 버크셔(Berkshire)종을 교잡시키는 경우 F_2 에서 백색과 흑색의 단성잡종 분리비는? (단, 흑색은 완전우성이며, 분리의 법칙을 적용한다.)
- ① 백색 1 : 흑색 3 ② 백색 2 : 흑색 2
 - ③ 백색 3 : 흑색 1 ④ 백색 4 : 흑색 0
15. 각 대립 유전자의 빈도가 0.5로 같을 때, 소의 모색은 흑색(B)이 적색(b)에 대하여, 뿔은 무각(P)이 유각(p)에 대하여, 얼굴색은 흰색(H)이 다른 색깔(h)에 대하여 우성으로 작용하며 이들 형질들은 각각 독립적으로 유전된다. BbPpHh의 유전자형을 가진 개체간에서 태어나는 자손 중 흑색 피모, 무각, 검은 얼굴을 가진 개체는 전체 중에서 얼마인가?
- ① 1/64 ② 3/64
 - ③ 9/64 ④ 27/64
16. 한우의 당대검정우의 조건에 해당하지 않는 것은?
- ① 등록기관에 혈통등록이상 등록되고 유전자검사결과 친자가 확인된 것
 - ② 씨암소에서 태어나고 생후 160일령 이전에 이유한 수송아지일 것
 - ③ 생후 180일령에 체중이 120kg 이하인 것
 - ④ 당대검정우나 당대검정우의 부모 또는 형제, 자매 중에서 선천성 기형이나 유전적 불량형질이 나타나지 않은 것
17. 상염색체에 존재하는 유전자에 의해 발현되나 그 개체의 발현은 성에 의해 영향을 받는 유전현상은?
- ① 종성유전(sex-influenced inheritance)
 - ② 반성유전(sex-linked inheritance)
 - ③ 한성유전(sex-limited inheritance)

- ④ 모계유전(maternal inheritance)
- 18. 어느 유전자좌(遺傳子座)에 있는 두개의 유전자가 양친으로부터 전달 받아 동일할 확률을 무엇이라고 하는가?
 - ① 근친계수 ② 혈연계수
 - ③ 상관계수 ④ 회귀계수
- 19. 어느 특정한 개체의 능력이 우수하고 그 우수성이 유전적 능력에 기인한다고 인정될 때, 이 개체의 유전자를 후세에 보다 많이 남기고 또 그 개체와 혈연관계가 높은 자손을 만들기 위하여 이용하는 교배 방법을 무엇이라 하는가?
 - ① 순종교배 ② 계통교배
 - ③ 상호 역교배 ④ 누진교배
- 20. 종성유전(sex-influenced inheritance)을 하는 형질은?
 - ① 토끼의 털 ② 닭의 횡반
 - ③ 개의 혈우병 ④ 면양의 뿔

2과목 : 가축번식생리학

- 21. 다음 중 최초로 수정란 이식을 성공한 사람과 축종을 옳게 짝지은 것은?
 - ① Austin : 토끼 ② Heape : 토끼
 - ③ Heape : 양 ④ Austin : 양
- 22. 암컷과 수컷의 신체적 접촉에 따른 설명으로 틀린 것은?
 - ① 암·수컷 모두의 생식활성이 증진된다.
 - ② 수컷의 존재는 암컷의 발정행동과 배란을 자극한다.
 - ③ 계절적 무발정이 종료될 무렵에 있는 면양과 산양을 수컷과 동거시키면 곧바로 발정이 발현된다.
 - ④ 수컷에 대한 교미전 자극은 사정된 정액의 성상에는 영향을 미치지 않고 안드로겐의 분비에만 영향을 미친다.
- 23. 다음 중 교미 배란을 하는 동물은?
 - ① 소 ② 토끼
 - ③ 개 ④ 돼지
- 24. 수컷(雄牲)의 2차 성징을 발현시키는 호르몬은/
 - ① 에스트로겐 ② 프로게스테론
 - ③ 테스토스테론 ④ 옥시토신
- 25. 다음 중 소의 분만 직전에 일어나는 분만징후를 잘못 설명한 것은?
 - ① 미근부의 양쪽이 돌출된다.
 - ② 점액성 분비물의 누출량이 많아진다.
 - ③ 외음부의 충혈종창이 심해진다.
 - ④ 점조성의 점액이 질내에 고인다.
- 26. 다음 가축별 발정주기와 발정지속시간을 나열해 놓은 것 중 틀린 것은?
 - ① 소 : 21 ~ 22일, 18 ~ 19시간
 - ② 돼지 : 20 ~ 25일, 25 ~ 30시간
 - ③ 면양 : 16 ~ 17일, 24 ~ 36시간
 - ④ 말 : 19 ~ 25일, 4 ~ 8일
- 27. 뇌하수체 전엽에서 분비되는 호르몬은?

- ① 성장호르몬(GH)
- ② 성선자극호르몬 방출호르몬(GnRH)
- ③ 프로락틴 억제인자(PRIF)
- ④ 임부용모성 성선자극호르몬(hCG)
- 28. 다음 중 가축의 수정적기를 결정하는 가장 중요한 요인은?
 - ① 발정축의 영양 상태
 - ② 환경온도와 일조시간
 - ③ 발정축의 체중과 월령
 - ④ 배란이 일어나는 시기와 수정부위까지의 정자 수송시간
- 29. 돼지에서 사정된 정액 중 정장물질(semical plasma)의 대부분이 분비되는 장소는?
 - ① 정소상체 미부 ② 정낭선
 - ③ 전립선 ④ 카우퍼선
- 30. 반추동물의 분만과정에서 양막이 파열되는 것을 무엇이라 하는가?
 - ① 제 1파수 ② 제 2파수
 - ③ 제 3파수 ④ 제 4파수
- 31. 정자 동결보존시 과냉각 상태와 빙정형성으로 인하여 병자의 대사능력과 생존성을 저하하게 하는 위기온도 범위에 해당되는 것은?
 - ① -10℃ ~ 5℃ ② -25℃ ~ -15℃
 - ③ -75℃ ~ -60℃ ④ -196℃ ~ -79℃
- 32. 비유 유지에 필요한 호르몬이 아닌 것은?
 - ① 프로락틴 ② 옥시토신
 - ③ 부신피질호르몬 ④ 바소프레신
- 33. 젖소에서 일정기간의 착유기간 후 다음 비유기 동안 최대한의 우유를 생산하기 위하여 실시하는 건유기의 가장 바람직한 기간은?
 - ① 20 ~ 30일 ② 30 ~ 50일
 - ③ 50 ~ 70일 ④ 70 ~ 90일
- 34. 1개의 제 1정모세포는 몇 개의 정자로 분화발달 되는가?
 - ① 1개 ② 2개
 - ③ 4개 ④ 8개
- 35. 수정능력을 획득한 정자가 난자의 투명대를 통과하기 위하여 일어나는 현상은?
 - ① 침체반응 ② 핵농축
 - ③ 연동운동 ④ 선회운동
- 36. 다음 중 소의 교배(인공수정) 적기는?
 - ① 발정개시 직후 ② 발정개시 후 4시간
 - ③ 발정개시 후 6시간 ④ 발정종료 전후 2시간
- 37. 융성생식기의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 카우퍼선(Cowper's gland)은 전립선을 말한다.
 - ② 부성선은 전립선과 정낭선 2개로 구성되어 있다.
 - ③ 정낭선의 분비액은 요도를 세척하고 알칼리성으로 중화한다.

- 55. 다음 중 탄수화물인 당류의 흡수 부위로 가장 적합한 것은?
 ① 소장 상부, 12지장 ② 소장 하부, 회장
 ③ 대장 하부, 맹장 ④ 대장 상부, 결장
- 56. NRC의 영양소 요구량(닭, 돼지)에 명시된 필수 지방산은?
 ① 올레산(Oleic acid)
 ② 리놀산(Linoleic acid)
 ③ 아라키돈산(Arachidonic acid)
 ④ 리놀렌산(Linolenic acid)
- 57. 단백질 분해효소가 아닌 것은?
 ① 펩신(Pepsin) ② 트립신(Trypsin)
 ③ 락타아제(Lactase) ④ 레닌(Rennin)
- 58. 다음 중 비타민 구분에 따른 연결이 틀린 것은?
 ① 비타민 A - pyridoxine
 ② 비타민 B₂ - riboflavin
 ③ 비타민 C - ascorbic acid
 ④ 비타민 B₁ - thiamin
- 59. 산란계의 강제환우 목적에 해당되지 않는 것은?
 ① 계란생산시기 조절 ② 환우기간의 단축
 ③ 육성비의 절감 ④ 일조시간의 증가
- 60. 반추가축의 소화기관 중 영양소별 흡수장소를 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 포도당은 제 4위에서 주로 흡수된다.
 ② 휘발성지방산(VFA)은 제 3위에서도 흡수된다.
 ③ 탄수화물 발효로 생성된 휘발성지방산(VF)은 단순확산에 의해 제2위벽으로 흡수된다.
 ④ 흡수된 휘발성지방산(VFA)은 제1위 정맥을 통해 문맥을 거쳐 간장으로 들어간다.

4과목 : 사료작물학 및 초지학

- 61. 옥수수는 그 특성에 따라 여러 종류로 나눌 수 있다. 다음 중 사료작물용으로 가장 적합한 종류는?
 ① 감립종(sweet corn) ② 폭립종(pop corn)
 ③ 마치종(dent corn) ④ 연립종(flour corn)
- 62. 건초의 품질평가에 있어서 양질의 건초에 대한 설명이 아닌 것은?
 ① 녹색도가 낮다.
 ② 앞의 비율이 높다.
 ③ 상쾌한 냄새를 낸다.
 ④ 헛잡물이 혼입되어 있지 않다.
- 63. 다음 중 수분함량이 높은 호밀을 직접 사일리지로 만들 때 가장 주의하여 조치할 사항은?
 ① 세절하지 않고 그대로 제조한다.
 ② 예건없이 예취하여 바로 제조한다.
 ③ 화분과목초와 함께 제조한다.
 ④ 미강이나 밀기울로 수분을 조절하여 제조한다.

- 64. 사일리지 제조시 수분함량 85%의 재료를 70%까지 건조시키려면 처음 재료의 중량이 얼마가 되게 건조시키면 되는가?
 ① 4/5 ② 3/4
 ③ 2/3 ④ 1/2
- 65. 건초보다 사일리지를 이용할 때의 특징으로 옳은 것은?
 ① 날씨의 영향을 많이 받는다.
 ② 저장 공간을 적게 차지한다.
 ③ 운반과 취급이 쉽다.
 ④ 기계화하기 어려워 노력이 많이 든다.
- 66. ha당 50톤의 목초(생초)가 생산되는 초지에서 비료 성분량으로 필요로 하는 질소 추비량은? (단, 생초 중 질소 성분 0.5%, 천연 공급량 150kg/ha, 비료이용율 50%일 경우)
 ① 50kg/ha ② 100kg/ha
 ③ 150kg/ha ④ 200kg/ha
- 67. 옥수수의 발아에 필요한 최저 온도범위에 속하는 것은?
 ① 5℃ ② 10℃
 ③ 15℃ ④ 20℃
- 68. 배과(화분과)가 우점된 초지에 공과목초의 식생비율을 증가시키기 위한 방법 중 틀린 것은?
 ① 방목강도 혹은 예취고를 낮춘다.
 ② 연간 예취회수를 늘린다.
 ③ 질소질비료를 증량 시비한다.
 ④ 인산과 칼리를 증량 시비한다.
- 69. 목초 건초를 조제할 때 예취시기가 건초의 품질에 미치는 영향으로 바르게 설명한 것은?
 ① 예취시기가 늦어질수록 소화율이 떨어진다.
 ② 예취시기가 빠를수록 단백질이 떨어진다.
 ③ 예취시기가 빠를수록 섬유질이 높다.
 ④ 예취시기가 늦을수록 섭취량이 증가한다.
- 70. 젖소 50두를 방목하기 위하여 방목지의 목초수량을 1×1m의 방형틀(quadrat)을 이용하여 조사하였는데 이때의 목초수량은 0.5kg/m²이었다. 방목지 면적이 1.5ha 라면 목초수량은 몇 kg이며, 1두당 몇 kg을 섭취할 수 있는 양인가? (순서대로 1.5ha 목초수량(kg)/ 1두당 섭취량(kg))
 ① 7,500 / 150 ② 6,500 / 120
 ③ 5,500 / 90 ④ 4,500 / 60
- 71. 일정 면적의 초지에 방목할 소의 두수(頭數)를 계산할 때 옳은 식은?

$$\frac{1\text{일}1\text{두당채식량} \times \text{방목일수}}{m^2\text{당생산초량} \times \text{채식률}}$$
 ①
$$m^2\text{당생산초량} \times \frac{\text{채식률}}{100} \times \text{방목일수}$$
 ②
$$\frac{1\text{일}1\text{두당채식량} \times \text{방목지면적}}{m^2\text{당생산초량} \times \text{채식률}}$$

$$\frac{1\text{일}1\text{두당채식량} \times \text{방목일수}}{m^2\text{당생산초량} \times \text{방목두수}}$$

- ③ $m^2\text{당생산초량} \times \text{방목두수}$
- ④

$$\frac{m^2\text{당생산초량} \times \frac{\text{채식률}}{100} \times \text{방목지면적}}{1\text{일}1\text{두당채식량} \times \text{방목일수}}$$

72. 중북부지방에서 담근먹이 옥수수의 뒷그루로 재배하기에 적합한 사료작물은?
 ① 대두 ② 진주조
 ③ 호밀 ④ 수수
73. 벼과(화분과) 사료작물의 일반적 특징을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?
 ① 잎은 나란이맥으로 되어 있으며, 줄기 위에 어긋나게 2열로 각 마디에 하나씩 나있다.
 ② 줄기는 대체로 속이 비어 있고, 둥글며 뚜렷한 마디를 가지고 있다.
 ③ 열매는 씨방벽에 융합되어 있는 하나의 종자를 가지고 있다.
 ④ 뿌리는 하나로 되어 있든가 또는 가지를 친 곧은 뿌리로 되어 있다.
74. 다음 중 목초 유식물의 억압력 지수가 가장 높은 초종은?
 ① 이탈리아안 라이그라스 ② 톨 페스큐
 ③ 티머시 ④ 켄터키 블루그라스
75. 초지를 주로 초가을에 조성하는 가장 중요한 이유는 무엇인가?
 ① 수분함량이 적당하기 때문에
 ② 온도 조건이 적합하기 때문에
 ③ 목초 종자가 여름에 수입되기 때문에
 ④ 잡초와의 경쟁을 피하기 위하여
76. 건조 조제시 수확 적기를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 생육기 ② 기상
 ③ 양분 생산량 ④ 파종량과 파종방법
77. 4포식 윤작법(Norfolk rotation)이 처음 개발된 국가는?
 ① 미국 ② 독일
 ③ 영국 ④ 일본
78. 다음 사료작물 중 옥수수의 품종에 속하는 것은?
 ① 광평옥 ② 점보
 ③ 쿨그레이저 ④ 카이유스
79. 사료작물 작부조합 선정시 고려해야 할 점 중 옳지 않은 것은?
 ① 같은 초종이라도 품종에 따라 숙기가 다르므로 품종에 대한 정확한 인식과 선택이 중요하다.
 ② 재배관리상 노력과 생산비용이 적게 드는 초종의 선택이 필요하다.

- ③ 보유기계나 장비, 사일로와 같은 시설은 물론 가축분뇨 등을 효율적으로 이용할 수 있는 초종선택이 필요하다.
- ④ 건물이나 가소화영양소총량(TDN) 보다는 생초수량이 많은 초종을 선택하여야 한다.

80. 공기 중 질소를 활발하게 고정하는 근류의 내부에 존재하는 색소는?
 ① 녹색 ② 무색
 ③ 갈색 ④ 적색

5과목 : 축산경영학 및 축산물가공학

81. 유동자본재가 아닌 것은?
 ① 사료 ② 비료
 ③ 트랙터 ④ 가축약품
82. 축산물 생산함수에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 투입과 산출간의 상관관계를 의미한다.
 ② 산출과 이익간의 상관관계를 의미한다.
 ③ 이익과 비용간의 상관관계를 의미한다.
 ④ 비용과 투입간의 상관관계를 의미한다.
83. 축산경영 수익성 지표로 옳지 않은 것은?
 ① 소득 ② 순수익
 ③ 자본회전율 ④ 1일당 가족노동보수
84. 복합경영의 장점에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 소량판매에 유리하다.
 ② 토지이용을 효율적으로 할 수 있다.
 ③ 수입원이 단일화되어 수익이 증가한다.
 ④ 복합적 노동에 의한 노동생산성이 향상된다.
85. 우리나라 도시근교형 낙농경영의 특징이라고 볼 수 없는 것은?
 ① 경영의 집약도가 다른 경영형태에 비해 높다.
 ② 시유용 원유를 생산 및 공급하는데 유리하다.
 ③ 규모를 확장하는데 제한적인 요인이 적은 편이다.
 ④ 토지면적이 좁고 구입사료에 의존하므로 사료의 자급률이 낮다.
86. 육우경영 조수익을 증대시키는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 송아지 판매두수를 늘린다.
 ② 송아지 판매단가를 높인다.
 ③ 송아지 생산효율을 높인다.
 ④ 송아지 사료비를 절감한다.
87. 소득에서 암묵적 비용인 가족노동 평가액, 자기자본이자, 자기토지지대를 공제한 것은?
 ① 순수익 ② 조수입
 ③ 자본이익율 ④ 가족노동보수
88. 다음 설명은 고정 자본재의 어떤 평가방법인가?

취득원가나 시가가 모두 분명하지 않은 경우 그 재화와 효용이 같은 유사재화의 취득가격을 평가기준가격으로 하는 방법이다.

- ① 수익가에 의한 평가 ② 매매가격에 의한 평가
 - ③ 임대가격에 의한 평가 ④ 추정가격에 의한 평가
89. 축산경영의 일반적 특징의 하나인 결합생산물을 가장 잘 나타내고 있는 것은?
- ① 산란계와 육계 ② 쇠고기와 소가죽
 - ③ 돼지고기와 우유 ④ 한우고기와 수입쇠고기
90. 축산 경영조직의 적정화를 설계할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은?
- ① 각 가축의 능력 관계
 - ② 입지조건의 적합여부
 - ③ 노동력 절약을 위한 기계화 관계
 - ④ 가축두수와 사료작물 또는 목초재배 관계
91. 무당연유의 제조공정에서 순서가 옳은 것은?
- ① 농축 → 균질 → 냉각 → 멸균 → 충전
 - ② 농축 → 균질 → 냉각 → 충전 → 멸균
 - ③ 균질 → 농축 → 냉각 → 멸균 → 충전
 - ④ 균질 → 농축 → 냉각 → 충전 → 멸균
92. 치즈의 일반적인 제조공정의 순서로 옳은 것은?
- ① 우유의 균질 → 살균 → rennet 첨가 → 유청배제 → 커드의 절단
 - ② 우유의 살균 → rennet 첨가 → starter 첨가 → 커드의 절단 → 유청배제
 - ③ 우유의 살균 → starter 첨가 → rennet첨가 → 커드의 절단 → 유청배제
 - ④ 우유의 균질 → 살균 → starter 첨가 → rennet 첨가 → 커드의 절단 → 유청배제
93. 원료로써 돈두육, 돈심장 등을 이용하여 조직 중의 함유된 젤라틴의 작용으로 고형화 한 것은?
- ① 텅 소시지 ② 헤드 치즈
 - ③ 블러드 소시지 ④ 리버 소시지
94. 다른 식육에 비하여 돼지고기에 특히 많이 함유된 비타민은?
- ① 비타민 A ② 비타민 B₁
 - ③ 비타민 C ④ 비타민 E
95. 육제품 제조에 사용되는 원료육의 품미에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 동물의 종류 ② 도체중
 - ③ 동물의 연령 ④ 사료
96. 다음 중 유제품 제조 시 수분을 첨가하는 이유가 아닌 것은?
- ① 건조 용이 ② 염지재료 용해
 - ③ 다즙성 유지 ④ 생산비 감소
97. DFD육에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 돼지고기와 암소에서 주로 발생한다.
- ② 육색이 어둡고 건조하다.
- ③ pH는 5.4를 나타낸다.
- ④ 신선육으로 적합하다.

98. 근육조직을 미세구조적으로 볼 때 망상구조를 가지며 근육 수축 시 Ca²⁺를 세포내로 방출하는 것은?
- ① 근절 ② 근초
 - ③ 근소포체 ④ 근원섬유
99. 다음 중 결합조직에 포함되지 않은 것은?
- ① 교원섬유 ② 탄성섬유
 - ③ 세망섬유 ④ 지방섬유
100. 저렴한 각종 원료육을 활용하며 육괴끼리 결합시킬 결합육을 사용하여 다양한 품미, 모양, 크기로 제조한 육제품은?
- ① press ham ② salami
 - ③ tongue sausage ④ belly ham

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	④	①	④	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	③	③	①	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	③	①	②	①	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	③	①	④	④	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	④	④	②	③	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	②	①	②	③	①	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	④	④	②	④	②	③	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	①	④	④	③	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	③	②	③	④	①	④	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	②	②	②	①	②	③	④	①