

17. 종자 발아력 검사방법 가운데 발아력을 가장 빨리 검사할 수 있는 방법은?
 ① X-선 검사법
 ② 효소활성 측정법
 ③ 전기전도율 검사법
 ④ 테트라졸리움(TZ) 검사법
18. 정선할 벼 종자 8000 kg 시료종자를 접수하여 수분함량이 23 %인 종자를 12 %로 건조시킬 때의 종자 중량은 얼마인가?
 ① 1,000 kg ② 2,000 kg
 ③ 5,000 kg ④ 7,000 kg
19. 종자를 판매 또는 보급하고자 할 때 종자보증을 받지 않아도 되는 경우는?
 ① 국립종자관리소에서 벼 종자를 보급하는 경우
 ② 시·군에서 보리 종자를 보급하는 경우
 ③ 작물시험장에서 종자를 연구용으로 사용하는 경우
 ④ 농협에서 감자 종자를 판매하는 경우
20. 품종보호 출원시 제출하는 작물별 시험용 종자 시료량으로 맞는 것은?
 ① 벼 : 400 g ② 보리 : 1,000 g
 ③ 콩 : 2,000 g ④ 밀: 1,500 g

2과목 : 식물육종학

21. 이계교배(異系交配)의 문제점이 될 수 없는 것은?
 ① 형질 고정 곤란 ② 유전자 구성의 복잡
 ③ 유전자 구성의 단순 ④ 교잡 불친화성
22. 시험구 배치에 있어서 품종과 반복이 반드시 같아야 하는 방법은?
 ① 분할 시험구법 ② 라틴방격법
 ③ 난괴법 ④ 임의 배치법
23. 바빌로프(Vavilov)가 주요 작물의 재배 중심지를 8개 지역으로 나누었을 때 벼는 어느 지구에 속하는가?
 ① 중국지구 ② 힌두스탄지구
 ③ 근동지구 ④ 중앙아메리카지구
24. 세포질 유전에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 세포질 유전물질은 플라스마진(Plasmagene)이라 한다.
 ② 색소체의 유전은 일반적으로 모계의 것만이 유전한다.
 ③ 세포질 유전 물질은 DNA에 의하여 구성되고 자기증식을 한다.
 ④ 멘델성 유전과 같이 대립인자가 있다.
25. 주동 유전자(major gene)와 폴리진(poly gene)의 차이점을 잘 설명한 것은?
 ① 주동 유전자는 지배가가 크다.
 ② 폴리진의 유전력은 확실하게 다음 세대에서 확인할 수 있다.
 ③ 폴리진은 양적형질을 나타내고 주동 유전자는 질적형질을 나타낸다.

- ④ 주동 유전자는 다른 유전자의 형질 발현을 억제한다.
26. 조기검정을 응용하여 단기간에 계통의 조합능력을 높이는 방법으로 3년을 1기간으로 하는 선발 방법은?
 ① 누적선발법 ② 순환선발법
 ③ 상반순환선발법 ④ 계통간교잡법
27. 품종의 퇴화를 유전자 퇴화와 생리적 퇴화로 나눌 때 생리적 퇴화에 속하는 것은?
 ① 토양적 퇴화 ② 돌연변이 퇴화
 ③ 자연교잡 퇴화 ④ 이형 유전자형의 분리
28. 다음 중 서로 관련되지 않는 것은?
 ① 수직 저항성 ② 수평 저항성
 ③ 미동유전자 저항성 ④ 총체적 저항성
29. 피자식물(被子植物)의 배젖은 다음 중 어느 것인가?
 ① n ② 2n
 ③ 3n ④ 4n
30. F₂ 집단의 유전력이 0.1이고 평균 수량이 500 g 일 때, 여기에서 우량개체를 선발하여 평균값이 750 g이 된다면 선발 개체군의 차대 집단의 평균 수량은?
 ① 500 g ② 525 g
 ③ 550 g ④ 575 g
31. 자연 교잡율이 4 % 이하에 속하는 자식성 원예작물은?
 ① 비이트 ② 당근
 ③ 양파 ④ 토마토
32. 양파의 웅성불임성인 Smsms와 NMsms의 다음 대에 나타나는 형은?
 ① NMsms, Nmsms ② NMsms, Smsms
 ③ SMsms, Smsms ④ SMsMs, SMsms
33. 잡종강세 육종법 중 F₁의 형질은 균일하나 종자 생산량이 적은 것은?
 ① A × B
 ② (A × B) × C
 ③ (A × B) × (C × D)
 ④ (A × B × C × D) × (E × F × G × H)
34. F₁에 있어서 일반 조합능력과 특정조합능력을 추정하는데 이용되는 검정 방법은?
 ① 단교배 검정법 ② 이면교배 검정법
 ③ 다계교배 검정법 ④ 톱교배 검정법
35. 품종의 특성을 유지하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 영양번식 ② 격리재배
 ③ 원원종 재배 ④ 교잡
36. 변이에 대한 설명이다. 틀린 것은?
 ① 환경변이는 육종의 대상이 되지 못한다.
 ② 아조변이는 영양번식 작물에서 이용된다.
 ③ 자연돌연 변이율은 유전자 자리당 10⁻⁵ ~ 10⁻⁶ 정도이다.
 ④ 돌연변이는 유전물질의 구조적 변화를 일으키는 것이다.

- ④ 이질 배수체는 육종상 가치가 없다.
- 37. 게놈(Genome)이 서로 다른 종속간 교잡에 의해서 얻어지는 잡종의 배수성은?
 ① 이질배수체 ② 동질이배체
 ③ 동질배수체 ④ 이수체
- 38. 다음 중 염색체의 수적(數的) 변이는?
 ① 역위 ② 이수성
 ③ 중복 ④ 전좌
- 39. 다음 중 잡종강세 현상이 나타나는 것과 가장 관계가 적은 가설은?
 ① 우성유전자 연관설
 ② 유전자 작용의 상승효과
 ③ 헤테로 접합성설
 ④ 돌연변이 유발설
- 40. 다음 변이 중 육종에 이용될 수 없는 변이는?
 ① 돌연변이 ② 방향변이
 ③ 교잡변이 ④ 아조변이

3과목 : 재배원론

- 41. 작물을 일반식물과 구별할 수 있는 특성은?
 ① 병에 대한 저항성이 강하다.
 ② 생존경쟁에 있어서 유리하다.
 ③ 특수부분이 잘 발달되어 있다.
 ④ 환경적응성이 뛰어나다.
- 42. 토양 유기물의 기능이 될 수 없는 것은?
 ① 다량원소와 미량원소를 공급한다.
 ② 암석분해를 억제한다.
 ③ 대기 중에 이산화탄소를 공급한다.
 ④ 미생물의 번식을 조장한다.
- 43. 다음 중 산성토양에 가장 약한 작물의 조합은?
 ① 벼, 감자, 땅콩, 수박
 ② 시금치, 알팔파, 콩, 사탕무
 ③ 당근, 옥수수, 목화, 오이
 ④ 호박, 토란, 아마, 기장
- 44. 사과와 단감을 같이 보관할 때 단감의 조직이 연해지는 이유는?
 ① 사과에서 Abscisic acid가 생성
 ② 단감에서 Auxin이 생성
 ③ 사과에서 Ethylene이 생성
 ④ 단감에서 Cytokinin이 생성
- 45. 식물 원형질의 팽만 상태는?
 ① 수분 포텐셜(ψ_w) = 0 bar
 ② 수분 포텐셜(ψ_w) = -5 bar
 ③ 수분 포텐셜(ψ_w) = -10 bar
 ④ 수분 포텐셜(ψ_w) = -15 bar

- 46. 논토양의 탈질현상을 방지하기 위하여 암모니아태 질소 비료를 주는 가장 적합한 때는?
 ① 이앙기 ② 정지하기 전
 ③ 최고분얼기 ④ 유수분화기
- 47. 다음 중 T/R율이 가장 많이 증대하는 것은?
 ① 칼륨비료 다량시용 ② 인산비료 다량시용
 ③ 질소비료 다량시용 ④ 석회다량 시용
- 48. 작물의 수량을 가장 많이 올리기 위해서 3가지 조건이 균형을 이루어야 하는데 다음 중 어느 것이 가장 합리적인가?
 ① 유전성 - 노동 - 환경
 ② 노동 - 환경 - 재배기술
 ③ 유전성 - 환경 - 재배기술
 ④ 노동 - 유전성 - 재배기술
- 49. pH 4.0~8.0인 토양에서 가장 잘 생육할 수 있는 작물은?
 ① 호밀 ② 시금치
 ③ 메밀 ④ 땅콩
- 50. 내병성 품종의 형태적 특성으로 가장 옳은 것은?
 ① 장간종이며 다비조건에서 줄기의 신장이 크다.
 ② 잎이 늘어지는 현상이 크다.
 ③ 줄기의 탄력성이 약하다.
 ④ 줄기가 굵고 단단하다.
- 51. 내습성이 가장 약한 작물은?
 ① 벼, 택사, 미나리 ② 발버, 옥수수, 울무
 ③ 감자, 고추, 메밀 ④ 당근, 양파, 파
- 52. 조파조식으로 영양생장기간을 연장하여 증수하고자 할 때 알맞는 기상생태형은?
 ① blt 형 ② Blt 형
 ③ bIT 형 ④ bLt 형
- 53. 농업의 특질에 대한 설명 중 틀리는 것은?
 ① 토지는 수확체감의 법칙이 작용한다.
 ② 농업노동은 분업이 곤란하다.
 ③ 농산물은 수급적응성이 적다.
 ④ 농산물은 수요의 탄력성이 크다.
- 54. 종자춘화형식물에 속하는 것은?
 ① 추파맥류, 봄울무우 ② 봄울무우, 양배추
 ③ 양배추, 히요스 ④ 잠두, 히요스
- 55. 가지과 작물로서 호광성 종자인 것은?
 ① 오이 ② 상치
 ③ 토마토 ④ 담배
- 56. 방사선동위원소가 방출하는 방사선 중 가장 현저한 생물적 효과를 가진 것은?
 ① α 선 ② β 선
 ③ γ 선 ④ X선

57. 포기전체가 넘어지는 도복은?
 ① 뿌리도복 ② 좌절도복
 ③ 만곡도복 ④ 이삭도복
58. 작물에 탄산시비를 하는 경우 그 효과는 다음 중 어느 것인가?
 ① 광합성 촉진 ② 호흡작용 감소
 ③ 전류작용 촉진 ④ 병해충 방제
59. 식품을 저장할 때 살균· 살충효과의 목적으로 흔히 사용하는 방사선 동위원소는?
 ① 45Ca ② 36Cl
 ③ 14C ④ 60Co
60. 감자를 생태적인 특성에 의하여 분류한 것은?
 ① 저온작물 ② 서류(薯類)
 ③ 전분작물 ④ 채소

4과목 : 식물보호학

61. 다음 중 유기합성 농약은?
 ① 보르도액 ② 다이아지논
 ③ 송지합제 ④ 석유유제
62. 작물의 어느 곳에 뿌려도 약액이 퍼져서 즙액을 빨아먹는 해충방제에 유용한 약제는?
 ① 잔류성 접촉제 ② 불임제
 ③ 침투성 살충제 ④ 훈증제
63. 칼탑 50 % 수용제를 1,000배로 희석해서 10a당 5말을 살포하려 한다. 칼탑 50 % 수용제의 소요량은 얼마인가?
 ① 120 mL ② 100 mL
 ③ 90 mL ④ 80 mL
64. 잡초의 천이에 가장 크게 작용하는 요인은?
 ① 강우 ② 비옥도
 ③ 토성 ④ 제초방법
65. 식물병의 제1차 전염원이 될 수 없는 것은?
 ① 종자내의 병원체
 ② 토양내 월동 균핵
 ③ 포장내 이병 잔재물
 ④ 생육기 병반상의 분생포자
66. 작물에 농약을 살포한 후 급성약해의 증상에 해당되는 것은?
 ① 반점 또는 낙엽현상 ② 영양장해 현상
 ③ 품질저하 현상 ④ 수확물 감소 현상
67. 그램염색시 적색으로 염색되는 그램음성균으로 분류· 동정에 활용되는 작물의 병은?
 ① 감자둘레썩음병
 ② 가지과 식물의 풋마름병
 ③ 감자더듬이병

- ④ 감귤게양병
68. 수도유효분얼 후 유수형성기 이전에 살포하는 제초제는?
 ① 벤치오 입제 ② 벤틀존 액제
 ③ 부타졸 입제 ④ 2,4-D 액제
69. 거미강 응애목이며 과수 및 채소 화훼작물의 줄기에 기생하여 즙액을 빨아먹고 흡즙 부위는 백색의 점이 생기고 몸의 양측에 검은 무늬가 뚜렷한 이 해충은?
 ① 점박이응애 ② 칠리리리응애
 ③ 차응애 ④ 각지응애
70. 응애 방제 방법 중 가장 적절한 방법은?
 ① 독성이 강한 약제 살포
 ② 응애 전문약제 지속 살포
 ③ 고농도 살포로 완전 방제
 ④ 저항성 유발 방지를 위한 계통이 다른 적용 약제의 교호 살포
71. 체외로 분비되는 곤충의 생리활성물질로 이를 이용하여 암수의 교미를 방해하여 방제하는데 이용되는 것은?
 ① 페로몬 ② 호르몬
 ③ 유인물질 ④ 불임제
72. 다음 중 생물학적 진단에 속하는 것은?
 ① 혈청반응을 이용한 진단
 ② 황산구리를 이용한 진단
 ③ 지표식물을 이용한 진단
 ④ 현미경을 이용한 진단
73. 균체의 대부분이 기주식물의 외표면에 존재하면서 흡기를 표피에 삽입하여 정착하는 병원균은?
 ① 흰가루병균 ② 노균병균
 ③ 그을음병균 ④ 잿빛곰팡이병균
74. 다음 중에서 벌목 곤충에 속하는 것은?
 ① 학질모기 ② 왕소등애
 ③ 왕개미 ④ 초파리
75. 완전변태하는 곤충은?
 ① 벌 ② 메뚜기
 ③ 매미 ④ 잠자리
76. 각종 작물의 잿빛곰팡이병 발생과 가장 관련이 깊은 기상 요인은?
 ① 일사량 ② 풍속
 ③ 대기습도 ④ 토양온도
77. 잡초로 인한 피해 중 농경지에서의 피해로 볼 수 없는 것은?
 ① 상호대립억제작용 ② 기생
 ③ 병해충의 매개 ④ 저수지의 부유식물
78. 다음 중 다년생 잡초는?
 ① 개비름 ② 방동사니
 ③ 명아주 ④ 쇠뜨기

79. 작물보호의 의미를 가장 적합하게 설명한 것은?
- ① 새로이 도입된 종합적 방제를 뜻한다.
 - ② 병·해충방제는 신농약으로 보호하는 것을 뜻한다.
 - ③ 병·해충방제는 환경 친화적인 방법으로 보호하는 것을 뜻한다.
 - ④ 작물의 병·해충·잡초·기상 등의 재해로부터 작물을 합리적으로 보호하는 수단을 말한다.
80. 사과나무 붉은별무늬병의 중간기주는?
- ① 갈매나무 ② 매발톱나무
 - ③ 까치밥나무 ④ 향나무

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	④	②	③	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	④	④	④	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	④	①	②	①	①	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	②	④	④	①	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	①	②	①	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	④	①	④	③	①	①	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	②	④	④	①	②	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	①	③	①	③	④	④	④	④